

ENTOMOLOGISCHE
BEYTRÄGE

Z U

DES RITTER LINNE

ZWÖLFTE AUSGABE

DES NATURSYSTEMS

V O N

JOH. AUG. EPHRAIM GOEZE,

Pastor an der Kirche S. Blasii zu Quedlinburg, Ehrenmitgliede
der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin, der
Herzoglichen deutschen Gesellschaft in Helmstädt, der
Naturforschergesellschaft in Halle, und der Königlich
Schwedischen patriotischen Gesellschaft
zu Stockholm.

DRITTEN THEILES VIERTER BAND.

L e i p z i g,

bey Weidmanns Erben und Reich. 1783.

INTOMOL OGGHE

BEYTRYCE

20

DES NITTE 1. 1. 1.

WOLTER 1. 1. 1.

DES NITTE 1. 1. 1.

20

DES NITTE 1. 1. 1.

DES NITTE 1. 1. 1.
DES NITTE 1. 1. 1.
DES NITTE 1. 1. 1.
DES NITTE 1. 1. 1.
DES NITTE 1. 1. 1.

DES NITTE 1. 1. 1.

DES NITTE 1. 1. 1.
DES NITTE 1. 1. 1.
DES NITTE 1. 1. 1.
DES NITTE 1. 1. 1.
DES NITTE 1. 1. 1.

VORREDE.

Hier der vierte und letzte Band des dritten Theils meiner entomologischen Beyträge. Wann der fünfte Theil erscheinen werde, kann ich noch nicht mit Gewissheit bestimmen.

In der Vorrede zu den vorigen Theilen habe ich die entomologischen Schriften angeführt, die in der Zeit noch herauskamen, da die Theile abgedruckt wurden, die ich also bey meiner Handschrift selbst nicht anführen konnte. Jetzt sollte ich also aus Cramers und Espers Hefen, wie auch aus Fabricii Spec. Inf. das Uebrige nachholen. Ich bitte aber meine Leser, diese Schriften selbst zu vergleichen, und das Fehlende ihren Exemplaren meiner Beyträge beyzufügen. Es würde die Vorrede sonst beynahe eben so stark, als dieser Band geworden seyn.

Lieber will ich einige, den Entomologen nützliche und sehr gegründete *Berichtigungen* mittheilen, die ich den freundschaftlichen Erinnerungen einiger meiner Freunde zu danken habe.

Zuerst von dem Herrn Pfarrer *Scriba* zu
Gräfenhausen.

Zum ersten Theil des dritten Bandes der Bey-
träge über die *Pap. Dan. Cand.*

- 1) Cramers P. D. C. *Nise* kann nicht Hecube, sondern ein anderer seyn. Der Sebaische ist es auch nicht.
- 2) Bey Eubule ist Seb. 38. f. 19. 20. angeführt, und eben dieser Sebaische steht unter den neuen *Lae-
te flavus*.
- 3) Bey Sennoe ist Seba t. 26. f. 5. 6. citirt; diese Larve und Puppe mit 7. 8. ist aber *Philea*.
- 4) Bey Cleopatra fällt also das Citatum Seba 26. f. 7. 8. weg.
- 5) Cramers *Eclipsis* ist nicht die Linnéische, sondern *Maerula Fabricii*.
- 6) Die Sulzersche *Teutonia* ist Cramers *Coronea*.
- 7) Die *Iphigenia* im Naturforscher ist Cramers *Pyrrha*.
- 8) Fabricii *Calypso* hat Seba t. 6. f. 9. 10. und t. 26. f. 3. 4.; letztere fällt also unter den neuen weg.
- 9) No. 84. unter den neuen Sebaischen ist *Leucippe* Cram. et Fabricii.
- 10) No. 89. unter den neuen ist *Odibes* Cram. der nämliche scheint auch Seba t. 18. f. 12. 13. zu stehen.
- 11) Der Bergsträsserische *Nelo* ist zuverlässig eine Varietät von *Rapae*.

12) *Creona*

- 12) Creona Cram. steht Seba t. 18. f. 4. 5.
- 13) Crameri Daplidice ist eigentlich Linn. Hellica.
- 14) Crabifera Cram. scheint Seba t. 38. f. 15. 16. zu seyn.
- 15) No. 97. Seba t. 45. f. 3. 4. oder t. 31. f. 9. 10. möchte Arganbe Fabric. seyn.

Vom Herrn Hofmeister *Knoch* zu
Braunschweig.

Diese sind wichtig und sehr genau.

Bey der Ph. Tortr. *Prasinana* L. wird im
Degeer Th. I. Qu. 1. S. 50. in der Note Rösels
IV B. t. 22. angeführt, und im Naturf. VII. p.
139. dieselbe Röselsche Abb. für die Linn. *Prasinana* ausgegeben.

Nach Degeer soll bey der *Prasin.* L. Raupe,
Puppe und Schmetterling eine grüne Farbe haben.
Dieses fällt aber bey dem Röselschen
Schmetterling a. a. O. weg, indem die Puppe
unten gelblich und oben röthlich blau aussieht.
Daher bin ich der Meynung, daß Linn. *Prasin.*
beym Rösel IV B. t. 10. f. 5. abgebildet worden,
und eben diejenige sey, welche Füesli p.
41. n. 798. Ph. Bicolorana nennet, und also De-
geer Tom. II. Qu. 2. p. 296. den Geoffr. Inf. II.
p. 172. n. 124. Rösel IV. t. 10. und Réaum. I.
t. 39. f. 10—14. mit Recht bey der *Prasinana*

angezogen habe. Das Linnéische Citat bey der Prafinana aus Rösel IV. t. 22. ist meiner Meynung nach falsch. Man darf nur die Abbildungen des Réaumur, Degeer und Poda mit jenen, und unter einander vergleichen, um die Sache ins Reine zu bringen. Die Rösel'sche Phal. Tom. IV, t. 22. f. 5. *ist keine Tortrix*. Dieses weiß ich aus häufiger Erfahrung. Ich halte sie für Geoffr. Ph. verte ondée. II. p. 172. n. 125. Die Theresianer haben sich wahrscheinlich durch das falsche Zitat beym Linné verleiten lassen, die Prafin mit der Ph. verte ondée für einerley zu halten.

Meine Leser vergleichen hierbey in diesem Bande p. 3. no. 285.



Beym Degeer Th. I. Qu. 2. S. 5. ist in der Note vieles von den Ursachen und Absichten der besondern Struktur des Gespinnstes der Ph. Pavonia gesagt worden. Seit vier Jahren habe ich Versuche mit diesen Gespinnsten gemacht. Ich habe die Reuse in der Mitte quer- durch geschnitten, und die Puppe in dem un- tern weitem Theile, den ich mit einer Nadel

an

an dem Kasten feststeckte, liegen lassen. Ich habe davon *ganz ausgewachsene* Schmetterlinge bekommen; dabey aber die Vorficht angewandt, daß ich sie in einem grossen Kasten, der inwendig nicht glatt war, auskommen ließ. Denn die Männchen sind sehr lebhaft, wenn sie nicht durch die enge Oeffnung kriechen müssen, und fallen während des vielen Hin- und Herlaufens sehr leicht, zumal wenn der Deckel oder die Wände des Kastens glatt sind. Fallen sie aber ein oder mehrere mal; so werden es Krüppel, und ihre Flügel wachsen nicht gehörig aus. Diejenigen, welche durch die Reuse kriechen, und in ihrer Ordnung nicht gestöret werden, sitzen bald stille, und kommen nicht so leicht in Gefahr zu fallen. Die Weibchen müssen sich besonders sehr anstrengen, um durch die enge Oeffnung der Reuse zu kommen, und geben sich daher gleich zur Ruhe, um auszuwachsen.

Wozu also der künstliche Bau des Gespinnstes? Der Allmacht des Schöpfers war es gefällig, bey diesem Schmetterling einen andern und künstlichern Weg zu wählen, wodurch er aus seinem Behältniß kommen konnte.

Die vom Degeer T. II. p. 250. no. 2. beschriebene Phaläne kann nicht Atomaria L. seyn. Diese hat Frisch XIII. S. 12. t. 5. abgebildet, ist viel kleiner, und bey weitem nicht so groß, als die vom Degeer abgebildete. Degeer ziehet auch Schaeff. Icon. t. 17. f. 3. an, wo offenbar Prunaria L. abgebildet worden, die auch Kleemann in seinen Beytr. I. t. 23. f. 3. geliefert hat, und von dieser ist bey dem Degeer die Rede. Denn er sagt: die Flügel wären auf der Oberseite alle Orangegelb, welches bey dem Männchen vorzüglich eintrifft; bey der Atomaria Linn. aber, die auch im Naturforscher III. t. 1. f. 4. schlecht gezeichnet ist, nicht statt findet. In der Note sind Hufnagel Berlin. Magaz. IV. p. 570. n. 12. der faule Esel; Gleditsch Forstwiss. Th. I. p. 390. n. 7. *Kleemanns* Beytr. I. p. 285. t. 34. angezogen. Vergleicht man aber die Beschreibung der Raupe und des Schmetterlings, so Degeer T. I. Qu. 2. p. 103 — 106. von dem großen braunen Fleischfarbig gestreiften Stockspanner macht, mit Kleemanns Beschreibung am angef. Orte von der Raupe t. 35. f. 1. 2. 3. und hält damit des Hufnagels und Gleditsch Atomaria, und Linn. Hirtaria zusammen; so wird

wird man sich schwerlich enthalten können, unter allen diesen Namen die *Hirtaria* Linn. zu verstehen. Ich habe sie sehr oft aus der Raupe gezogen, und gefunden, daß die Degeeriſche Beſchreibung l. c. und die Kleemannſche mit der Natur genau übereinflimmen. Kleemann wußte es nicht, was für ein Schmetterling aus der t. 35. f. 1. 2. 3. abgebildeten Raupe komme. Denn er giebt die t. 34. f. 4. abgebildete für die Raupe des t. 34. f. 6. 7. vorgeſtellten Schmetterlings aus. Dieſe habe ich niemals gehabt, und wenn Kleemann darinn nicht irrt, wie ich denn nicht glaube; ſo hat der von ihm gezeichnete Spanner, oder *Hirtaria* Linn. *zweyerley Raupen*, wie ich dergleichen auch bey andern Arten gefunden habe. Des Degeer T. I. Qu. 1. p. 256. n. 6. t. 5. f. 21. beſchriebene und abgebildete Phaläne halte ich für *Atomaria* Linn. Degeers Ph. Noctua Tom. II. Qu. 2. p. 293. und 294, ſo Schäffer t. 112. f. 1. 2. abgebildet, iſt Linn. Ph. N. Exclamationis, und Hufnagels Ph. N. Clavus; alſo wohl keine neue Art. Es hat auch Degeer Tom. II. Qu. 1. p. 253. bey der *Fasciaria* Linn. den Röſel I B. Cl. 3. t. 3. unrecht citirt.

Uebrigens hat Herr Cammerrath *Jung* in seinem Verzeichniß der meisten bisher bekannten europäischen Schmetterlinge: 1782,

über die Atomaria,

— Aprilina,

— Ludifica,

viele Berichtigungen geliefert.

Bey dieser Gelegenheit aber kann ich nicht umhin, noch dieses anzuzeigen, wie mich Herr *Knoch* sehr versichert hat: daß Herr *Herbst* im 2ten Stück des Füessl. Archivs Männchen und Weibchen der Atomaria nebst der Raupe und Puppe, unter dem Namen: *Artemisaria*, Beyfußspanner, beschrieben und abgebildet habe.

Das 2te Stück der *Knochischen* Beyträge zur Insektengeschichte, mit sieben sehr fein ausgemalten Kupfertafeln, kann ich meinen Lesern abermal nicht genugsam empfehlen.

Herr *Knoch* ist so sehr philosophischer Beobachter und Entomologe, daß eben dadurch seine Beobachtungen an *Genauigkeit* und *Annehmlichkeit* einen vorzüglichen Werth erhalten, und eine große Menge schöner kostbarer Mahlbücher unserer Zeiten weit hinter sich zurücklassen, darinn man nichts, als Genera, Spe-

Species, u. s. w. von der wahren Naturgeschichte aber fast gar nichts findet. Meine Leser werden mir danken, daß ich ihnen statt einiger magern Auszüge aus jenen, aus diesen einige lehrreiche und höchst interessante Bemerkungen mittheile,

In der Vorrede sagt Herr K. sehr richtig: daß man doch allen Fleiß anwenden möchte, die Abbildungen natürlicher Dinge der Natur so getreu als möglich zu machen, weil sonst die Herrlichkeit des Schöpfers mit entstellt würde. Ein Vorzug, den nur solche geschickte Hände, als die Knochischen, die selbst so vortrefflich zeichnen, ihren Werken geben können!

Ferner eine ansehnliche Vermehrung einer Fauna Bructera. Er hat, wie ich, angemerkt, daß in dem Moosse des Berges viele Puppen unbekannter Spannmeßer liegen.

P. 1. Ph. N. virens L. n. 139. davon p. 2. eine eigene Besonderheit. Die Zunge dieser Phal. ist von der Basis an bis in die Mitte gespalten, da sie sonst nur von der Mitte bis an die Spitze gespalten ist. Vielleicht ist sie hier nur zusammengeklebt gewesen, wie mir oft vorgekommen

men ist. Diese Phaläne ist auch hier zum *erstenmal* abgebildet.

P. 4. Ph. Geom. pustulataria, die L. nicht hat.

P. 7. Ph. G. Prunaria L. Varietas, zu der verschiedene Citata bey der Sordiatia L. gehören. Die Beschreibung der *Raupe* in schönem Latein, meisterhaft. Kenner der Entomologie werden die Schwierigkeit einer solchen Beschreibung fühlen, besonders bey Larven, die so sehr variiren, und sich durch keine merkliche Farben auszeichnen.

Besonders genau p. 12. die Bemerkungen über die Oekonomie und Lebensart dieser Raupen.

P. 17. heisst es unter andern in der Anmerkung: „Könnte man die mannigfaltigen Abänderungen, die sich sowohl an Kammförmigen als Borstenähnlichen Fühlhörnern der Schmetterlinge finden, ohne Hülfe eines Vergrößerungsglases bemerken; so glaube ich, nicht ohne Grund, daß selbige bey sehr vielen Gattungen ein wesentliches Unterscheidungszeichen abgeben würden.“

Es wären denn doch dies nur einzelne Merkmale, die nie einen vollständigen Begriff eines
natür-

natürlichen Körpers geben. Sie müssen alle zusammen genommen werden.

P. 21. no. 4. Ph. N. Lucipara L. no. 181. t. 1. f. 4. 6. 7. Hier zum *erstenmale* abgebildet. p. 28. sehr artige philosophische Anmerkungen.

„Linné, sagt der V. giebt diese Art für selten aus. Ihm selbst ist er im Freyen nie zu Gesicht gekommen; da hingegen die Raupe jährlich in grofser Menge vorhanden sey. Wie viele der bereits bekannten Nachtschmetterlinge würden also fehlen, wenn ihre Raupen nicht aufgesucht wären, die sich wegen ihrer lebhaften Farben, ihrer Begierde zur Nahrung, und der davon zurückgebliebenen Spuren, oft ihrer, das Auge an sich ziehenden Kunsttriebe, ihrer Unruhe bey bevorstehender Verwandlung, und anderer Ursachen wegen nicht so sorgfältig verbergen können, als sie es grösstentheils in ihrem letzten und vollkommenen Zustande zu thun pflegen, worinn sie am Tage gewöhnlich der Ruhe geniessen, und einen ihren trüben und dunklen Farben sehr ähnlichen Aufenthalt wählen, der sie auch oft durch seine Dunkelheit gegen alle Nachstellungen in Sicherheit setzt? Dahingegen finden sich meistens an denen Schmetterlingen sehr in die Augen fallende Far-

Farben und Zeichnungen, deren Raupen uns durch ihr Ansehen und durch den Aufenthalt in Saamenkapseln, in dem Mark des Holzes, oder in der Erde sehr oft verborgen bleiben.“

Bey gewissen *Käferarten* ist das Verhältniß fast eben so. Wie lange sind die unansehnlichen Larven der Prachtkäfer (*Buprestis*) in alten faulen Holzstämmen verborgen geblieben, und wie schön sind oft die Käfer?

P. 29. Ph. N. Tanaceti no. 5. t. 2. f. 1. 9.

Abermal hier *zuerst* abgebildet. Die Raupen können seitwärts, wie einige Blattwickler, 5 bis 6 Zoll weit springen.

P. 36. eine artige Bemerkung, die ich auch aus meiner Erfahrung sehr wahr befunden habe.

„Obgleich diese Raupe eine glatte Haut und helle in die Augen fallende Farbe hat; also von dieser Seite gegen ihre Feinde nicht sonderlich geschützt ist; so habe ich dennoch keine, auch selbst nicht unter den gesündesten Ausgewachsenen gefunden, deren ich oft eine Menge zusammengebracht, welche von andern Insekten beschädigt gewesen wären. Auch waren die Puppen, welche mir nicht ausgekommen sind, niemals besetzt. Ich will

es gern zugeben, daß sie sich durch ihr starkes Schlagen mit dem Kopfe, und andere heftige Bewegungen gegen die Angriffe ihrer Feinde vertheidiget. Allein warum setzen diese Waffen nicht auch andere Arten, welche damit versehen sind, in Sicherheit? Sollten vielleicht die bittren Säfte, welche unsere Raupe aus ihren Nahrungspflanzen zieht, den gewöhnlichen Raupenverfolgern einen Ekel erregen, so wie den Bohrkäfern, Holzläusen und Schabkäfern bey aufgetrockneten Insekten, welche mit bittern Extrakten bestrichen sind? Ich wünschte, daß auch andere Naturforscher hierüber Beobachtungen anstellen möchten.“

Diese Raupen brachten ihre Puppenhülle ohne Erde aus großen und kleinen Stücken von morschem Weidenholze, die unter ihre Futterkräuter geworfen waren, glücklich zu Stande.

P. 38. 39. 40. 41. ist das kunstmässige Verhalten der Raupe in Verfertigung ihres Gespinnstes beschrieben, da sie in Verlegenheit gesetzt war, ihren Bau nach einem ganz andern Plan, als der ihr in der Natur angewiesen war, also nur nach den zufällig veranlaßten Umständen, zu machen, wobey der V. sagt: „Ich glaube nicht zu irren, wenn ich diese Kunsthandlung

lung unter *die ersten* setze, die jemals an Insekten bemerkt worden sind.“

Und wir stimmen ihm völlig bey. Der gleichen Bemerkungen können nicht genug gesammelt werden. Die Handlung der Raupe zeugt offenbar von gewissen Graden von Verstandeskräften. Und solche Anmerkungen sind die rechten Materialien zu einer *Psychologie der Thiere*.

P. 44. sagt der V. in der Anm. „Die *verlängerten Zungenfutterale* sind beynahe ein unterscheidendes Merkmal bey allen Puppen der *Kappenhalsigen Eulen*; doch weichen sie auch unter sich von einander ab.“

Sehr richtig und wahr. Ich fordere hierdurch den Verfasser öffentlich auf: *die Kappenhalsigen Eulen* von den *Noctuis* L. ganz zu trennen, und sie zunächst auf die *Sphinges* folgen zu lassen. Sie verdienen es, und geben dazu selbst die Charaktere an die Hand. Er ist auch der Mann dazu, der nicht nöthig hat, in verba Magistri jurare. —

P. 47. no. 6. Ph. N. *Artemisiae*, die L. nicht hat.

P. 50. von den *Dörnchen an den Fußblättern* dieser *Kappenhalsigen Eulen*, daß sie wegen

gen ihrer *Ordnung* sehr in die Augen fallen, fast allen Eulen gemein sind, und wahrscheinlich zum Mittel dienen, sich fest anzuhalten.

P. 51. no. 7. Ph. N. Trapezina L. no. 99.
Von den Mordraupen dieser Phaläne p. 55. besondere Bemerkungen:

1) Dafs sie *in ihrer Freyheit* auch andre Raupen verzehren, wobey sie der V. oft angetroffen hat.

2) Dafs sie sich ungern wieder an Pflanzen gewöhnen, wenn man sie eine Zeitlang mit andern Raupen gefüttert hat.

3) Dafs sie durch das Fleischfressen bisweilen etwas von der grünlichen Farbe verlieren, und bräunlich werden.

4) Dafs eine Kleinere oder Schwächere oft einer Größern überlegen wird, und dieselbe auf die hinterlistigste Art angreift.

„Sie sucht ihr erst von hinten zu durch einen tückischen Biss eine Wunde beyzubringen. Ist ihr solches geglückt; so läßt sie die Verwundete so lange unangefochten, bis sie von ihrer Wunde matt und krank wird. Dann fällt sie über sie her, und giebt ihr die letzten tödtlichen Bisse.

Nach p. 56. ist dem V. Sphinx Euphorbiae nach acht Tagen ausgekommen, der gewöhnlich ein, auch zwey Jahr in der Puppe liegt. Also giebts wegen der gewissen Zeit des Auskommens noch keine Regel.

P. 58. no. 8. Ph. B. Fagi L. no. 30. Von der Larve p. 59. abermal eine meisterhafte Beschreibung. Ihre Geschichte ist noch nicht aufgeklärt genug. Von ihren unförmlich langen Füßen, welche Absicht? Offenbar erschweren sie ihr das Gehen. Sie stämmt sie in die Höhe, wenn ein Geräusch gemacht wird, oder wenn sie Gefahr fürchtet. Die Schmetterlinge kommen äußerst selten vollkommen aus den Puppen, wenn sie auch gar nicht in ihrer Ruhe gestört werden. Was mag davon die Ursache seyn?

P. 68. no. 9. Ph. G. pulveraria L. no. 215. Diese, die wahre *Clerksche*, aber nicht Defoliaria.

P. 71. no. 10. Ph. N. Parthenias L. no. 94. t. 3. f. 8. zum *erstenmale* hier abgebildet: das *Weibchen*. Es ist dieselbe, als unter meinen neuen Ph. glaucescens: Beytr. III Th. 3 B. p. 206. no. 63.

P. 75. no. 11. t. 4. Ph. Pyr. Tarficrinalis, der *Haarfuss*. Eine ganz neue Art.

P. 79. no. 12. t. 5. f. 1-6. Ph. Pyr. Barbalis L. no. 329. wegen der Haare und Fühlhörner merkwürdig.

P. 81. no. 13. t. 5. f. 8. Ph. Tin. Degeerella L. no. 426. Aeufserst lange besondere Antennen.

P. 85. no. 14. Pap. Pl. Rur. W album, das weisse W. t. 6. f. 1. 2. Varietas Pap. Illicis Esper. An diversa species?

P. 88. no. 2. t. 6. f. 3. Pap. Pl. Rur. Hippothoë. Varietas fœminae.

P. 90. no. t. 6. f. 4. 5. Pap. Pl. Rur. Amphidamas.

P. 93. no. 4. t. 6. f. 6. 7. Pap. Pl. Rur. Erebus. Eine ganz neue Art.

Die t. 6. abgebildeten Tagfalter find alle merkwürdig. Ihre Geschichte, so wie andrer ihres Geschlechts, verdient noch immer eine genaue Untersuchung. Auch ist es merkwürdig, daß einige dieser Pap. Pl. Rural. in verschiedenen Gegenden häufig, in andern gar nicht gefunden werden. In unserer Gegend Hippothoë,

pothoë, Amphidamus, W album und Erebus gar nicht; Virgaureae äusserst selten.

P. 95. Scarab. hemipterus L. no. 63. t. 7. f. 11. 12. wegen des besondern Kopfs. f. 12.

Gewiss ist in diesen wenigen Bogen mehr *wahre Naturgeschichte* enthalten, als in manchem prächtigen ausgemahlten Werke, das einige hundert Thaler kostet.

Vor der Neujahrsmesse 1783.

G O E Z E.

V. *Blattwickler*. Ph. Tortrices. *)

Chenilles plieuses Papillons (Phalenes) larges d'épaules. Réaumur.

Nach der Wiener Entomologen Eintheilung: *Syst. Verz. der Schmetterlinge der Wiener Gegend* p. 125. giebt es sechs Klassen derselben.

1) Grüne; 2) Metallische; 3) Gelbe; 4) Braune; 5) Graue; 6) Düstere.

282. Phal.

*) Linné hat sie alle unter dem allgemeinen Namen: Tortrices, begriffen; allein Réaumur hat schon einen Wink gegeben, daß ihre Oekonomie und Verwandlung nicht nach einerley Ordnungen und Gesetzen erfolge, mithin darinn schon der Grund zu einer natürlichen, und der Erfahrung gemäßen Eintheilung zu suchen sey. S. *Mém. des Ins.* Tom. II. *Mém.* 5. 6. &c. Er setzt unter diesen Raupenarten drey Ordnungen: 1) einige biegen nur den Rand des Blattes über oder unter sich, und überziehen den noch offenen Raum mit einem Gewebe (Chenilles plieuses); 2) andere rollen das Blatt in mehrere Windungen (Chenilles rouleuses). Jene also Blattwickler; diese Blattroller. 3) Noch andere spinnen mehr Blätter zugleich oder die Blüthen der Pflanze in einen Knospen zusammen, und dieses entweder einsam, oder gesellschaftlich (Chenilles lieuses en paquet; Chenilles lieuses des fleurs); Blattbinder. S. Abhandl. von der *Winkelraupe*, nebst einigen Vorschlägen zu derselben Vertilgung: 8. Berl. und Leipz. 1779. mit e. Kupfer. Es ist dies aber Ph; G. L. *Brumata*, und keine *Tortrix*.



282. Phal. *Tortr. Cereana*, die *Wachsmotte*. *)

Müllers Linn. Naturfyst. 5 Th. 1 B. p. 722. no. 282.
der *Honigdieb*.

Fabric. S. E. p. 655. *Tinea*. 1. *Cerella*:

Alis griseis, postice emarginatis: dorso canaliculato, fusco.

283. *Fasciana*, das *Weißband*. **)

Müller l. c. p. 723. no. 283. *Weißband*.

Wiener Schmett. p. 131. E. *Graue Blattwickler*, Ph.
Tortr. Cinereae: n. 36. *Unbekannte Raupe*;
Dunkler Wickler mit *breitem weißem Querbande*. T. *Fasciana* L.

Geoffr. Inf. II. p. 188. no. 14. *Tinea fusca*, capite fusco, alis pone albidis.

La *Teigne bedaupe à tête brune*. Long. 4
lign.

Raj. Inf. p. 204. no. 99. *Phalaena parva*, alis oblongis, *Tineae* instar, e fusco et albo bicoloribus, nigra parte alba longiore.

Aequa-

*) Ich kann nicht sagen, was den *Linné* bewogen hat, diese unter die *Wickler* zu setzen, da sie eher zu den eigentlichen *Motten*, *Tinea*, zu gehören scheint. Ich habe die Verwüstungen der *Larve* an einer mit Wachs und Harz imprägnirten *Kindesmumie* erfahren. Als ich sie vor drey Jahren bekam, waren hin und wieder kleine mit Wurmmehl angefüllte Löcher zu sehen. Dies bewog mich, sie eine geraume Zeit in Weingeist zu legen, und wieder zu trocknen. Dessen ohnerachtet zeigen sich bis jetzt noch immer kleine weiße Larven darinn, die sie durchlöchern. Das Wachs muß vorzüglich die Nahrung der Larven seyn. Ich kann aber nicht sagen, ob es dieselbe Art mit denen in den Bienenstöcken sey, weil ich sie nicht zur Verwandlung bringen können.

**) Nicht abgebildet.

Aequalis vestivora, at paulo minor.

Scop. Ent. carn. p. 233. no. 586. *Phal. Fasciana.*

Alae anticae supra fusco glaucoque variae;
fascia lata postica albida.

Habitat in *Pomis*, quorum folia convolvit.

Long. Lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.

Mülleri (Otto Fridr.) Faun. Fridr. p. 55. no. 471.

Ph. T. fasciana. *Nom. Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1494. *Nom. Linn.*

284. *Uncana*, der Klauenflügel.

Müller l. c. p. 723. no. 284. *Klauenflügel.*

Wiener Schmett. p. 91. Y. *Afterspannraupen*, Lar-
vae *Pseudogeometrae*; Blendende *Eulen*, *Ph.*
Noct. Submetallicae: n. 4. *Unbekannte Raupe*;
Braunblanke weißgezeichnete Eule; N. *Unca.*
Ph. Geom. Uncana L.

Fabric. S. E. p. 646. no. 7. *Pyralis uncana.* *Nom.*
Linn.

— *Spec. Inf. II.* p. 277. no. 8.

Otto *Fabric.* Faun. Groenl. p. 195. no. 151. *Nom.*
Linn.

Habitat inter frutices ad ripas rivulorum.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 455.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1495. *Nom. Linn.*

Clerk Phal. t. 3. f. 7.

285. *Prasinana*, der Graßgrünwickler. *)

Müller l. c. p. 723. no. 285. der *Erlenwickler.*

A 2

Füeslins

*) Die beyden vom *Linné* angeführten Schriftsteller bey dieser *Prasinana*: *Réaumur*, und *Degeer* gehören nicht zu derselben, sondern zu einer besondern Art, welche *Füesl.* *Bicolorana* nennet. Wegen des rothen Flügelrandes aber möchte die *Geoffroy'sche* II. no. 125. wohl die wahre *Prasinana* L. seyn.

Füeslins Verz. Schweiz. Inf. p. 41. no. 797. Ph. *Prasina*. Bey uns selten auf *Eichen*.

Röfels Insektenbel. IV. p. 252. t. 22. die zu der NV. 2ten Kl. gehörige schöne gelblichtgrüne Büchen-raupe. *)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 94. no. 271. der *Erlenwickler*.

Wiener Schmett. p. 125. A. *Grüne* Blattwickler, Ph. Tortr. *Virides*: no. 2. *Hageeichenwickler*raupe (Querc. Rob.); *Hageeichenwickler*. T. *Prasin.* L.

Gleditsch Forstw. I. p. 557. no. 13. Ph. Tortr. *prasinana*, das *grüne Blatt*, der *grüne Blattwickler*. p. 656. no. 44. der *gelbgrüne weißpunktirte Blattwickler*.

Bekm. Ep. S. Linn. p. 167. no. 285. Ph. T. *prasinana*. Nom. Linn.

Geoffr. Inf. II. p. 172. no. 125. *Phalaena* *Seticornis* *Spirilinguis*; alis deflexis viridibus; fascia duplici transversa saturatiore. **)

La Phalène verte ondée.

Long. 7 Lign.

Fabric. S. E. p. 645. no. 3. *Pyralis prasinana*. ***)

Variat antennis pedibusque albis et fulvis.

— *Ejusd.* *Species Insectorum* I. p. 276. no. 5. *Pyralis Fagana*.

Alis

*) Die *Röfelsche* IV. t. 22. ist mit der t. 10. nicht einerley, sondern die letztere ist die *Bicolorana* des *Füesl.* *Réaum.* und *Degeer*.

**) Ses Ailes superieures sont vertes, bordées d'un peu de rouge et nuancées de trois bandes presque transverses d'un vert plus foncé.

***) *Röfel* IV. t. 10. wie auch *Réaum.* und *Degeer* gehören nicht hieher.

Alis viridibus, strigis tribus obliquis albis;
antennis pedibusque fulvis.

Larva viridis, linea laterali flava, cauda bifida.

Pupa intra folliculum, gibbosum, ferrugineum.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 456. Ph. T. *prasinana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1496. Ph. T. *prasinana*. Nom. Linn.

286. *Viridana*, der *Grünwickler*. *)

Müller l. c. p. 723. no. 286. der *Grünwickler*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 799. Ph. *Viridana*.
Sehr häufig auf *Eichen*.

— Magaz. der Entomol. II. p. 38. Ph. *Viridana*.
Die Raupen des Chorherrn Meyer hatten alle
auf dem achten Absatz braune Flecke.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4 Kl. p. 5. t. 1. der in
den Eichenblättern wohnende grüne *Blattwickler*
mit kleinen schwarzen Punkten.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 29. der
Grünwickler.

Wiener Schmett. p. 125. A. Grüne Blattwickler:
no. 3. *Kahneichenwickelraupe* (Querc. Rob.);
Kahneichenwickler. T. *Viridana* L.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 656. no. 45. der ganz grüne
Blattwickler sonder Flecke, II. p. 752. no.
78.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 463. E. *Blattwickler*:
no. 22. der ganz grüne *Eichenwickler*.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 17. *Viridana*.

A 3

Oekono-

*) Das Zitatum: Frisch III. n. 8, t. 5. das Linné hierbey angeführt hat, gehöret zu *Clorana*.

Oekonomische Nachrichten der patriotischen Gesellschaft. in Schlesien I. p. 142. 143. 152.

Der fahlgrüne Blattwickler für die Obstbäume der gefährlichste; der minder gefährliche, doch immer schädliche, der schwarze bunte und gestreifte.

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 286. *T. Viridana.* Nom. Linn.

Syst. Natur. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 85. *Phalène du Saule.*

Geoffr. Inf. II. p. 171. no. 123.

Phalaena seticornis spirilinguis, humeris latis, antennis flavescentibus, alis dilute virescentibus.

La Chappe verte. Long. 4 lign.

Fabric. S. E. p. 646. no. 4. *Pyralis Viridana.* Nom. Linn.

Larva nuda, 16poda, viridis, nigro-punctata; pedibus posticis flavis.

Pupa brunnea, postice stylo bifido.

— *Ejusd. Species Inf.* II. p. 277. no. 6. *P. viridana.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 457. *T. Viridana.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1497. *T. Viridana.* Nom. Linn.

287. *Clorana*, der Wollweidenwickler.

Müller l. c. p. 724. no. 287. t. 22. f. 13. der Weidenwickler.

Füeslins schweiz. Inf. p. 41. no. 800. Ph. *Clorana.*

— *Magaz. der Entomol.* p. 38. Ph. *Clorana.* Nach des Chorherrn *Meyer* Bemerkung überwintern die Puppen. *Rösel* sagt; nach 14 Tagen erschienen

schienen die Vögel. Vermuthlich *zwo* Generationen im Jahr.

Erfisch Inf. III. p. 18. no. 8. 2 Pl. t. 5. die kleine graue *Weidenraupe* mit dem grünen *Zwiefalter* — mit ganz grünen *Oberflügeln* mit weißem Saum, und weißen *Unterflügeln* (also der *Röfelsche* I. NV. 4 Kl. t. 3.).

Röfels Insektenbel. I. NV. 4 Kl. p. 8. t. 3. der dicke grünlichgraue *Blattwickler* zwischen den *Weidenblättern*.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 60. no. 167. der *Weidenwickler*.

Wiener Schmett. p. 126. A. Grüne Blattwickler: no. 4. *Weidenwickelraupe* (Salic. Pentandr.); *Weidenwickler*. T. *Clorana* L.

Réaumur Inf. II. Mém. 5. p. 236. t. 18. f. 6. 7. f. 4. *Coque en bateau*.

Fabric. S. E. p. 646. no. 5. *Pyralis Clorana*.

Nom. *Linn. Spec. Inf.* II. p. 277. no. 7.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 458. T. *Clorana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1498. T. *Clorana*.
Nom. *Linn.*

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 475. no. 8. t. 10. f. 5-9.

Phalène chappe verte à bordure blanche.

Phalène à antennes filiformes à trompe, à ailes larges en toit vertes en dessus bordées de blanc, & blanches en dessous.

— *Uebersf.* 2 B. I Th. p. 350. no. 8. t. 10. f. 5-9.
die grüne weißgerändelte *Mantelphaläne*.

288. *Litterana*, der *Buchstabenflügel*. *)

Müller l. c. p. 724. no. 288. der *Buchstabenflügel*.

Λ 4

Füesl.

*) Nicht abgebildet.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 801. Ph. Litterana.
Gleditsch Forstwiss. II. p. 753. no. 77. T. littera-
na, der dunkelgrüne Blattwickler mit schwarzen
Zeichnungen.

Der Wiener Nachtrag p. 317. Tortrices. A. Grüne
Wickler: no. 5. Unbekannte Raupe; hochgrüner
schwarz gezeichneter Wickler. T. Litterana L.
Fabric. S. E. p. 646. no. 6. Pyralis Litterana,
 — *Spec. Inf. II. p. 284. no. 51.*

289. *Zoegana*, der Rostpunkt.

Müller l. c. p. 724. no. 289. der Wechselfunkt.
Füesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 802. Ph. Zoegana.
Bey uns selten.

Wiener Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattwickler: no.
4. Unbekannte Raupe; strohgelber Wickler mit
einem braunen Winkelstrich.

Fabric. S. E. p. 648. no. 18. Pyralis Zoegana.
Alis flavis; puncto medio lituraque postica
ferrugineis.

— *Spec. Inf. II. p. 280. no. 25.*
Clerk Phal. t. 4. f. 4.

290. *Hamana*, der Hakenflügel.

Müller l. c. p. 724. no. 290. der Hakenflügel.
Gleditsch Forstwiss. II. p. 754. no. 79. T. hamana.
Der Blattwickler mit gelben Oberflügeln, die
mit einem braunrothen Punkte und einer solchen
hakenförmigen Zeichnung versehen sind.

Wiener Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattwickler: no.
3. Unbekannte Raupe; zitrongelber Wickler mit
einem braunen Wiederhaken. T. Hamana. L.
Fabric. S. E. p. 648. n. 18. β. Pyr. Hamana. Nom.
Linn.

(als eine *Abänderung* der *Zoegana*.)

Clerk

Clerk Phal. t. 4. f. 47.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1500. T. Hamana. Nom. Linn.

291. *Kackeritziana*, der *Upsalische Einpunkt*. *)

Müller l. c. p. 725. no. 291. der Einpunkt.

Wiener Schmett. p. 177. C. Gelbe Blattwickler: no. 1. Unbekannte Raupe; bleichgelber Wickler mit einem Mittelpunkt. T. Kackeritziana L.

292. *Oporana*, der *Netzförmige Wickler*.

Müller l. c. p. 725. no. 292. das Netz.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 788. no. 15. T. Oporana, die rothgraue gefleckte und gegitterte Aepfelbaummotte.

Wiener Schmetterl. p. 128. D. Braune Blattwickler, T. Ferrugineae: no. 2. Zwetschenwickelraupe (Pruni domest.); Zwetschenwickler. T. Oporana L.

*Glasers physik. ökon. Abh. von den schädlichen Raupen der Obstbäume. (neue Ausg. 1780.) p. 35. t. 3. f. 5. 6. 7. **)*

Fabric. S. E. p. 651. no. 33. Pyralis Oporana. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 283. no. 43.*

Geoffr. Inf. II. p. 170. no. 119.

A 5

Pha

*) Nicht abgebildet.

**) Da diese Wickler so sehr in der Farbe ändern, und gelblich, bräunlich, grünlich und röthlich gefunden werden; so trage ich kein Bedenken, die *Glaserschen* Wickler hierher zu ziehen. Obgleich der *Röfelsche* I. NV. 4. Cl. 1. 2. vom *Geoffroy* hierher gerechnet wird; so wollte ich ihn doch lieber mit andern Schriftstellern für die folgende *Rosana* L. halten.

Phalaena feticornis spirilinguis, humeris latis, aurato-flavescens, alarum fascia transversa, maculaque duplici fusca.

La Chappe à bande & tache brune. Long. 4 lign.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1499. T. Oporana. Nom. Linn.

293. *Rosana*, der *Rosenwickler*.

Müller l. c. p. 725. no. 293. der Rosenwickler.

*Röfels Insektenbel. I. NV. 4 Kl. t. 2. p. 7. der schwarze Blattwickler mit weißen Punkten auf den Kirschbäumen. *)*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 30. der Rosenwickler.

Friesl. Magaz. der Entomol. II. p. 38. T. Rosana (mit dem Röfelschen Zitato I. NV. 4. t. 2.). Die Raupe auch in Haselblättern und Eichenblättern. Sind den Schlupfwespen unterworfen.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 869. no. 1. T. Rosana, die kleine Blattwicklermotte des Rosenstrauchs.

— p. 1033. no. 4. T. Rosana, die Rosenblattwicklermotte mit der grauen Querbinde in den Oberflügeln.

Blankaart Schaupl. der Raupen t. 8. f. E F G H.

Wiener Schmett. p. 128. C. Gelbe Blattwickler; no. 10. Heckenrosenwickelraupe (Rosae caninae); Heckenrosenwickler.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 86. Phalène de la Rose.

AE.

*) Aus diesem Röfelschen macht der Staatsr. Müller Faun. Fr. p. 58. n. 523. eine neue Art von Matten: Ph. *Tinea Hebenstreitella*:

Alis subfuscis, priorum maculis tribus obscuris umbraticis.

Act. Upsal. 1736. p. 25. no. 77. *Papilio* alis depressis brevissimis testaceis.

Fabric. S. E. p. 647. no. 9. *Pyrallis Rosana.* Nom. Linn.

— *Spec. Insect.* II. p. 278. no. 11.

Réaumur. Inf. II. t. 15. f. 5-9.

Degeer Inf. I. Mém. 13. p. 403. t. 27. f. 4. 8. II. 12.

14. *Uebers.* I. 3 Qu. S. 17.

— *Tom.* II. P. I. p. 468. no. 1.

Phalène à antennes filiformes à trompe; à ailes larges brunes; à taches & lignes transverses obscures, dont les inférieures sont noirâtres en dessus, à barbillons courbés.

Phalène chappe brune à réseau des arbres fruitiers.

— *Uebers.* II B. I Th. p. 345. no. 1. der netzförmige Braunmantel auf den Obstbäumen.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 130. no. 1503. *T. Rosana.* Nom. Linn.

294. *Gnomana*, die Querstreife.

Müller l. c. p. 725. no. 294. der Schiefband.

Wiener Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattwickler: no. 7. Unbekannte Raupe; bläßgoldgelber Wickler mit rothbraunen Schrägstreifen.

Fabric. S. E. p. 651. no. 32. *Pyrallis Gnomana.* Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 285. no. 42.

Clerk Phal. t. 4. f. 13.

Geoffr. Inf. II. p. 171. no. 121.

Phalaena seticornis spirilinguis, humeris latis, flava, fascia transversa fusca.

La Chappe brune à bande brune.

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 469. no. 3.

Phalène à antennes filiformes à trompe, à ailes larges d'un jaune foncé à lignes obliques & nuances brunes.

Phalène chappe jaune à bande brune du Poirier.

— *Uebersf.* II B. I Th. p. 346. no. 3. der Gelbmantel mit einer braunen Binde auf den Birnbäumen.

295. *Xylosteana*, der Heckkirschenwickler.

Müller l. c. p. 725. no. 295. der Kreuzträger.

Neuer Schaupl. der Natur II B. p. 247. der Kreuzträger.

Wiener Schmett. p. 128. D. Braune Blattwickler, T. Ferrugineae: no. 4. Heckenkirschenwickelraupe (Lonicerae Xylostei); Heckkirschenwickler. T. *Xylosteana* L.

Clerk Phal. t. 2. f. 6.

Fabric. S. E. p. 648. no. 14. *Pyralis Xylosteana*.

Alis anticis testaceis; fascia fusca.

— *Spec. Insect.* II. p. 279. no. 19.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1501. T. *Xylosteana*. Nom. *Linn.*

296. *Arcuana*, der Bogenwickler.

Müller l. c. p. 726. no. 296. die Bogenbinde.

Wiener Schmett. p. 126. B. Metallische Blattwickler: no. 11. Unbekannte Raupe; goldgelber Wickler mit einer schwarzen Makel und Silber. T. *Arcuana* L.

Catholicon A. p. 456. T. *Arcuana*.

Fabric. S. E. p. 649. no. 22. *Pyralis Arcuana*.

Alis luteis; fasciis tribus *arcuatis* maculaque
disci atra; punctis tribus argenteis — Lineolae
tres argenteae ad basin alarum.

— Spec. Inf. II. p. 281. no. 31.

Clerk Phal. t. 10. f. 8.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 461. T. *Arcuana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1506. T. *Arcuana*.
Nom. *Linn.*

297. *Avellana*, der *Haselwickler*.

Müller l. c. p. 726. no. 297. *Haselwickler*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 570. no. 9. T. *Avellana*,
der *braune bandige Blattwickler der Haselstau-*
de.

Wiener Schmett. p. 127. C. *Gelbe Blattwickler*, T.
Flavae: no. 8. *Haselstaudenwickelraupe* (*Coryli*
Avellanae), *Haselstaudenwickler*. T. *Avellana* L.
Catholic. A. p. 631. T. *Avellana*.

Albin Inf. I. t. 95. f. g. h.

Fabric. S. E. p. 650. no. 25. *Pyralis Avellana*.
Nom. *Linn.*

— Spec. Inf. II. p. 281. no. 34.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 460. T. *Avellana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1505. T. *Avellana*.
Nom. *Linn.*

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 72. Phal.
des Jardins.

298. *Ameriana*, der *Gemeinstrich*.

Müller l. c. p. 726. no. 298. der *Gemeinstrich*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 803. T. *Ameriana*.
Auf den *Weiden*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 754. no. 80. T. *Ameria-*
na, der *eigentliche Weidenblattwickler*.

Wiener Schmett. p. 128. C. Gelbe Blattwickler: no. 11. *Sahlweidenwickelraupe* (Sal. Capreae), *Sahlweidenwickler*. T. *Ameriana* L.

Fabric. S. E. p. 647. no. 11. *Pyrallis Ameriana*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 278. no. 15.

299. *Piceana*, der *Fichtenwickler*.

Müller l. c. p. 726. no. 299. der *Pechflügel*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 503. no. 7. T. *Piceana*, der *Nadelwickler*.

Clerk Phal. t. 2. f. 9.

Mülleri Faun. Fr. p. 52. no. 459. T. *Piceana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1502. T. *Piceana*. Nom. Linn.

300. *Ministrana*, der *Roststrich*.

Müller l. c. p. 726. no. 300. der *Rothrand*.

Wiener Schmett. p. 128. D. Braune Blattwickler: no. 5. *Unbekannte Raupe*; *Zimmetbrauner goldgelb gemischter Wickler*. T. *Ministrana*.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 75. Phal. de *Jardin*.

Fabric. S. E. p. 648. no. 15. *Pyrallis Ministrana*. Nom. Linn.

— *Spec. Insect.* II. p. 279. no. 20.

Clerk Phal. t. 2. f. 12.

301. *Lecheana*, der *I L Wickler*.

Müller l. c. p. 727. no. 301. das I L.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 822. no. 17. die *preussische Blattwicklermotte*.

Pontoppid. N. H. von Dännem. p. 223. t. 17. Ph. Tortr. *Lecheana*.

Wiener Schmett. p. 126. B. *Metallische Blattwickler*: no. 3.

no. 3. *Ahornwickelraupe* (*Aceris campestris*),
Ahornwickler. T. *Lecheana* L.

Clerk Phal. t. 10. f. 2.

Fabric. S. E. p. 649. no. 23. *Pyrallis Lecheana*.
Nom. *Linn*.

— *Spec. Inf.* II. p. 281. no. 32.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 462. T. *Lecheana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 131. no. 1507. T. *Lecheana*.
Nom. *Linn*.

302. *Branderiana*.

β) *Fusca*, der *Braunwickler*.

Müller l. c. p. 727. no. 302. t. 22. f. 14. der *Braun-*
wickler.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 754. no. 76. T. *Fusca*,
der *braune Blattwickler*.

Fabric. S. E. p. 648. no. 13. *Pyrallis fusca*.
Nom. *Linn*.

Clerk Phal. t. 4. f. 7.

Mülleri *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1504. T. *fusca*.
Nom. *Linn*.

303. *Christiernana*, der *blutadrichte Wickler*.

Müller l. c. p. 727. no. 303. die *Blutader*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 805. Phal. *Christier-*
nana.

Wien. Schmett. p. 128. C. *Gelbe Blattwickler*: no. 9.
Unbekannte Raupe; hochgelber Wickler mit ro-
senrothen Gitterstreifen.

Schäff. Icon. t. 145. f. 4.

Fabric. S. E. p. 649. no. 24. *Pyrallis Christier-*
nana. Nom. *Linn*.

— *Spec. Inf.* II. p. 281. no. 33.

304. *Forskåleana*, das *gelbe Netz*.

Mül.

Müller l. c. p. 727. no. 304. das gelbe Netz.

Wiener Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattwickler: no. 6. Rosenwickelraupe (*Rosae Centifoliae*); Rosenwickler. T. *Forskaleana* L.

Fabric. S. E. p. 652. no. 41. *Pyrallis Forskaleana*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 285. no. 57.

Clerk Phal. t. 10. f. 2. 6.

Mülleri Faun. Fr. p. 52. no. 463. T. *Forskaleana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 131. no. 1508. T. *Forskaleana*. Nom. Linn.

305. *Loeflingiana*, das Doppelkreuz.

Müller l. c. p. 727. no. 305. das Doppelkreuz.

Fabric. S. E. p. 652. no. 42. *Pyrallis Loeflingiana*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 285. no. 58.

Clerk Phal. t. 10. f. 6.

306. *Hartmanniana*, der Doppelstrich. *)

Müller l. c. p. 728. no. 306. der Doppelstrich.

Faun. Suec. ed. 2. no. 1322.

307. *Bergmanniana*, das vierfache Silberband.

Müller l. c. p. 728. no. 307. das Silberband.

Füesl. schweiz. Inf. p. 41. no. 806. Phal. *Bergmanniana*. Selten.

Wiener Schmett. p. 126. B. Metallische Blattwickler, no. 5. Unbekannte Raupe, gelber Wickler mit Silberstrichen. T. *Bergmanniana* L.

Clerk Phal. t. 10. f. 5.

Fabric. S. E. p. 652. no. 43. *Pyrallis Bergmanniana*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 285. no. 59.

Scop.

*) Nicht abgebildet.

Scop. Entom. carn. p. 232. no. 584. Ph. Bergmanniana.

Alae anticae flavae, nodulis binis, fasciisque argenteis, margine fusco-ferrugineo.

Long. lin. 3½ Lat. 2.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 465. T. Bergmanniana.

— *Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1509. T. Bergmanniana. Nom. Linn.*

Degeer Inf. II. P. I. p. 469. no. 4.

Phalène à antennes filiformes à trompe, à ailes larges d'un jaune orangé luisant avec quatre rayes transverses d'un brun argenté.

Phalène Chappe jaune à rayes argentées.

— *Uebers. II B. I Th. p. 346. no. 4. der Gelbmantel mit Silberstreifen.*

308. *Holmiana*, das silberne Dreyeck.

Müller l. c. p. 728. no. 308. das silberne Dreyeck.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 807. Ph. Holmiana.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 789. no. 17. T. Holmiana, die kleine gelbrothe Obstmotte mit dem dreyeckigen silberfarbigen Rundfleck.

Wien. Schmett. p. 127. B. Metallische Blattwickler: no. 16. Birnwickelraupe (l'ÿri comm.); Birnwickler. T. Holmiana L.

Fabric. S. E. p. 650. no. 31. Pyralis Holmiana. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 283. no. 41.*

Clerk Phal. t. 10. f. 7.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 73. Phalène des Pommiers.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 466. T. Holmiana.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1510. T. *Holmiana*. Nom. Linn.

309. *Rolandriana*, der *Krummstrich*. *)

Müller l. c. p. 728. no. 309. der *Krummstrich*.

Wiener Schmett. p. 128. C. Gelbe Blattwickler: no.

12. *Weißnießwurzwickelraupe* (*Veratri albi*);

Weißnießwurzwickler. T. *Rolandriana* L.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 467. T. *Rolandriana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1511. T. *Rolandriana*. Nom. Linn.

310. *Solandriana*, der *Birkenwickler*.

Müller l. c. p. 728. no. 310. der *Birkenwickler*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 551. no. 10. T. *Solandriana*, der *Birkenblattwickler*.

Scop. Entom. carn. p. 234. no. 587. T. *Solandriana*.

Macula media, communis, ovata, alterius coloris; alae anticae margo crassior apicem versus fusco-punctatus.

Long. Lin. 5. Lat. $2\frac{x}{2}$.

Fabric. S. E. p. 648. no. 17. *Pyralis Solandriana*.

Alis pallidis, albo-subfasciatis, macula communi dorsali, ferruginea.

— *Spec. Inf.* II. p. 280. no. 23.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1513. T. *Solandriana*. Nom. Linn.

Degeer Inf. I. t. 28. f. 29. 30.

— Ueberf. 3 Quart. p. 20.

— — II. Part. I. p. 485. no. 3.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes

ailes pendantes d'un brun clair à tache triangulaire blanche sur la femelle & brune sur le male au bord interieur.

Phalène brune à lozange blanche du Bouleau.

— *Uebersf.* II B. I Th. p. 358. no. 3. *die braune Birkenphaläne mit dem weissen rautenförmigen Fleck.*

311. *Hastiana*, die weiße Schrägbinde.

Müller l. c. p. 729. no. 311. die *Krummbinde*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 755. no. 82. T. *Hastiana*, die blaugraue *Weidenmotte* mit der schräglaufenden weissen Binde.

Wiener Schmett. p. 126. B. *Metallische* Blattwickler: no. 4. *Bruchweidenwickelraupe* (*Salicis fragilis*); *Bruchweidenwickler*. T. *Hastiana* L.

Clerk Phal. t. 2. f. 7.

Fabric. S. E. p. 650. no. 26. *Pyrallis Hastiana*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 282. no. 36.

312. *Wahlbomiana*, das Wolkenband. *)

Müller l. c. p. 729. no. 312. das *Wolkenband*.

Wiener Schmett. p. 131. E. *Graue* Blattwickler: no. 20. *Unbekannte* Raupe, grauer *Wickler* mit dunklen Flecken. T. *Wahlbomiana* L.

System. Nat. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 74. *Phalène* de la grandeur d'une petite Mouche, qu'on trouve quelquefois dans les Jardins.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 468. T. *Wahlbomiana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 131. no. 1512. T. *Wahlbomiana*. Nom. Linn.

*) Nicht abgebildet.

313. *Lediana*, die Silberschuppe.

Müller l. c. p. 729. no. 313. die Silberschuppe.

Wiener Schmett. p. 127. B. Metallische Blattwickler: no. 13. *Porschwickelraupe* (*Ledi palustris*); *Porschwickler*. T. *Lediana* L.

Fabric. S. E. p. 650. no. 27. *Pyralis Lediana*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II.* p. 282. no. 37.

Clerk Phal. t. 10. f. 12.

314. *Alstroemeriana*, der Seitenrostfleck.

Müller l. c. p. 729. no. 314. der Braunfleck.

Wiener Schmett. p. 130. E. Graue Blattwickler: no. 18. Unbekannte Raupe; weifsgrauer Wickler mit Purpurflecken. T. *Alstroemeriana* L.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 5. der Braunfleck. T. *Alstroemeriana* L.

Clerk Phal. t. 10. f. 1.

Fabric. S. E. p. 653. no. 44. *Pyralis Alstroemeriana*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II.* p. 286. no. 61.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 469. T. *Alstroemeriana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 131. no. 1514. T. *Alstroemeriana*. Nom. Linn.

315. *Schalleriana*, die Rostflügelspitze. *)

Müller l. c. p. 729. no. 315. der Rostfleck.

Fabric. S. E. p. 650. no. 28. *Pyralis Schalleriana*.

Alis canis; macula marginali ferruginea.

Puncta aliquot muricata ad basin alae anticae.

— *Spec. Inf. II.* p. 282. no. 38.

316. *Schrae-*

*) Nicht abgebildet.

316. *Schraeberiana*, das weisse Randdreieck. *)

Müller l. c. p. 729. no. 316. das weisse Dreieck.

Fabric. S. E. p. 650. no. 30. *Pyralis Schreberiana*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 282. no. 40.

317. *Logiana*, der Kohlenstaub.

Müller l. c. p. 730. no. 317. der Kohlenstaub.

Wiener Schmett. p. 130. E. Graue Blattwickler: no.

4. Unbekannte Raupe; graulichweisser Blattwickler mit düsterer Aussenrandmakel. T. *Logiana* L.

Fabric. S. E. p. 651. no. 34. *Pyralis Logiana*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 283. no. 45.

Clerk Phal. t. 10. f. 3.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 470. T. *Logiana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1515. T. *Logiana*. Nom. *Linn.*

318. *Gouana*, der Schneeflügel. **)

Müller l. c. p. 730. no. 318. das Braunfutter.

Fabric. S. E. p. 651. no. 35. *Pyralis Gouana*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 283. no. 46.

319. *Brunnichana*, der Rhombus. ***)

Müller l. c. p. 730. no. 319. das Viereck.

Wiener Schmett. p. 132. F. Düstere Blattwickler: no. 2. Unbekannte Raupe; schwärzlicher Wickler mit weislicher Gemeinmakel. T. *Brunnichana* L.

B 3

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 649. no. 21. Pyralis Brunni-
chana. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 281. no. 30.*

320. *Pariana*, die bleyfahle Rinde.

Müller l. c. p. 730. no. 320. die Bleybinde.

Wiener Schmett. p. 132. F. Düstere Blattwickler:
no. 8. Unbekannte Raupe; düsterer Wickler mit
gezähnten Oberflügeln. T. Pariana L.

Clerk Phal. t. 10. f. 9.

321. *Moderiana*, der braune Randfleck. *)

Müller l. c. p. 730. no. 321. der Randfleck.

Linn. S. N. ed. 10. p. 823. Phal. Rurina.

Fabric. S. E. p. 650. no. 29. Pyralis Moderiana.
Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 282. no. 39.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1516. T. Mode-
riana. Nom. Linn.

322. *Uddmanniana*, der Quersfleck. **)

Müller l. c. p. 730. no. 322. der Quersfleck.

Wiener Schmett. p. 130. E. Graue Blattwickler: no.
8. Himbeerwickelraupe (Rubi idaei); Himbeer-
wickler. T. Uddmanniana L.

Fabric. S. E. p. 648. no. 16. Pyralis Uddmannia-
na. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 279. no. 22.*

323. *Cruciana*, der Bogenfleck. ***)

Müller l. c. p. 731. no. 323. der Bogenfleck.

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 649. no. 19. Pyralis Cruciana.
Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 280. no. 26.*

324. *Fabriciana*, das *Punktpaar*.*)

Müller l. c. p. 731. no. 324. das Punktpaar.

Fabric. S. E. p. 653. no. 45. Pyralis Fabriciana.
Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 286. no. 62.*

325. *Pupillana*, das *Silberauge*.**)

Müller l. c. p. 731. no. 325. das Silberauge.

326. *Heraciana*, der *Kronenwickler*.

Müller l. c. p. 731. no. 326. der Kronenwickler.

Fabric. S. E. p. 655. no. 56. Pyralis Heraciana.

Alis depressis, griseis; anticis subtus fuscis.

— *Spec. Inf. II. p. 288. no. 77.*

Schaeff. Monogr. 1758. t. 2. f. 3. 4.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1517. T. Hera-
cliana. Nom. Linn.

Degeer Inf. I. t. 29. f. 6. 7.

— *II. Part. I. p. 407. no. 5.*

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à
ailes croisées avec plusieurs petits traits noirs,
dont les barbillons en cornes & les pattes poste-
rieures sont très-velues.

Phalène à ailes croisées de la Berce.

— *Uebersf. II B. I Th. p. 294. no. 5. die Bären-*
klauphaläne mit gekreuzten Flügeln.

Unabgebildete Linnéische Blattwickler.

1. *Fasciana.*

2. *Literana.*

3. *Hartmanniana.*

B 4

4. Ro-

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

4. *Rolandriana*.
5. *Wahlbomiana*.
6. *Schalleriana*.
7. *Schraeberiana*.
8. *Gouana*.
9. *Brunnichana*.
10. *Moderiana*.
11. *Uddmanniana*.
12. *Cruciana*.
13. *Fabriciana*.
14. *Pupillana*.

Neue Arten von Blattwicklern.

1. *Phal. Tortr. Populana*, der *Pappelwickler*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. Sepos. p. 550. no. 2296.

Phalaena seticornis spirilinguis; corniculis duobus subulatis recurvis, alis incumbentibus, nigro cinereoque nebulosis.

Habitat in truncis *Populi tremulae* cujus foliis Larva victitat, eaque convolvit.

Syst. Natur. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 79. Phalène sur les troncs du Peuplier.

2. *Bankiana*, der *Eulenförmige Wickler*.

Fabric. S. E. p. 644. no. 1. Pyralis Bankiana.

Alis albis, macula communi fusca.

Habitat in *Anglia*. Statura fere *Noctuae*.

3. *Hattorfiana*, der *Hattorfwickler*.

Fabric. S. E. p. 647. no. 8. P. Hattorfiana.

Alis fuscis; strigis cinereis, sesquitertiis.

Habitat in *Germania*.

— *Spec. Inf. II. p. 278. no. 10.*

4. *Decussana*, der Leipziger Wickler.

Fabric. S. E. p. 647. no. 10. P. Decussana.

Alis cinereo, nigro argenteoque tenuissime fasciatis; apice macula subocellari cinerea.

Habitat *Lipsiae*.

— *Spec. Inf. II. p. 278. no. 14.*

5. *Maculana*, der vierfleckige Wickler.

Fabric. S. E. p. 647. no. 12. P. Maculana.

Alis anticis fuscis; maculis quatuor dorsalibus atro-ferrugineis.

In *Sueciae Nemoribus*.

— *Spec. Inf. II. p. 279. no. 16.*

6. *Fuscana*, der Braunling.

Fabric. S. E. p. 648. no. 13. P. Fuscana.

Alis anticis fuscis, immaculatis.

— *Spec. Inf. II. p. 279. no. 17.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2, p. 345. no. 1321. Ph. T. fuscana.

Alis superioribus fuscis.

In *Nemoribus*.

Clerk Phal. t. 2. f. 1. Ph. Fuscana.

7. *Laetana*, der Schwarzpunkt.

Fabric. S. E. p. 649. no. 20.

Alis anticis fuscescentibus; margine exteriori baseos niveo, nigro punctato.

In *Sueciae Nemoribus*.

— *Spec. Inf. II. p. 281. no. 29.*

8. *Squamana*, der Schuppenwickler.

Fabric. S. E. p. 651. no. 36.

Alis virescentibus, scabris.

In *Anglia*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 284. no. 50.

9. *Emargana*, der *Dickrand*.

Fabric. S. E. p. 651. no. 37.

Alis subcaudatis, flavis, fusco-reticulatis, fasciaque lata fusca, margine crassiori emarginato.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 284. no. 52.*

10. *Caudana*, der *Schwanzwickler*.

Fabric. S. E. p. 651. no. 38.

Alis subcaudatis griseis; margine interiore fulvo; exteriori emarginato.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 284. no. 53.*

11. *Quercana*, der *sächsishe Eichenwickler*.

Fabric. S. E. p. 652. no. 39.

Alis anticis flavis; maculis duabus costalibus sulphureis.

In *Saxoniae Quercu*.

Wiener Schmett. p. 128. C. Gelbe Blattwickler: no.

13. *T. Fagana*, *Büchsenwickler*. Tab. I. a. f. 6.
b. f. 6.

12. *Ocellana*, der *gedügte Wickler*.

Fabric. S. E. p. 652. no. 40.

Alis cinereis; litura media sanguinea; puncto albido.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 285. no. 56.*

13. *Conwagana*, der *Silberpunkt*.

Fabric. S. E. p. 653. no. 46.

Alis ferrugineo-fuscis, argenteo-punctatis
maculaque dorsali flavicante.

In *Angliae* Nemoribus.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 286. no. 63.

14. *Aurana*, der Goldfleck.

Fabric. S. E. p. 653. no. 48.

Alis fuscis; maculis duabus aureis,

In *Anglia*.

— Spec. Inf. II. p. 286. no. 66.

15. *Rivellana*, die Spaltstreife.

Fabric. S. E. p. 654. no. 50.

Alis fuscis; fasciis tribus cinereis; secunda in-
trorsum bifida.

In *Sueciae* Nemoribus.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 69.

16. *Dorsana*, der Rückenbogen.

Fabric. S. E. p. 654. no. 52.

Alis fuscis, arcu dorsali albo apiceque strigis
argenteis.

In *Lipsiae* hortis.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 71.

Geoffr. Inf. II. p. 189. no. 16.

Tinea alis nigris, superioribus macula qua-
drata alba, ex quatuor lineolis albis transversis
composita.

La Teigne à quarrure.

Long. 2½ Lign.

17. *Strigana*, der Rost- und Silberfarbig gestreifte
Wickler.

Fabric. S. E. p. 654. no. 53.

Alis flavescentibus, apice strigis ferrugineis
argenteisque; puncto triplici atro.

In Sueciae Nemoribus.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 72.

18. *Depressana*, der *Hangeflügel*.

Fabric. S. E. p. 655. no. 57.

Alis depressis, fuscis, capite, thoraceque ni-
veis.

Habitat in Suecia.

— Spec. Inf. II. p. 289. no. 78.

19. *Koenigiana*, der *ostindianische braungestäubte Wickler*.

Fabric. S. E. p. 653. no. 47.

Alis fulvis, apice nigris, fulvo-maculatis.

— Spec. Inf. II. p. 286. no. 65.

20. *Leeana*, der *Bleywickler*.

Fabric. Gen. Inf. c. Mantiss. p. 292. no. 7-8.

Pyralis alis plumbeis; lineolis tribus macu-
laque magna apicis ferrugineis.

— Spec. Inf. II. p. 278. no. 9. *Pyralis Plumba-
na.* Habitat *Hamburgi*.

21. *Pallidana*, der *bläßgelbe Wickler*.

Fabric. Mantiss. p. 292. no. 9-10.

Alis pallide flavis; strigis duabus obliquis fer-
rugineis.

— Spec. Inf. II. p. 278. no. 12.

Habitat *Hamburgi*.

22. *Servana*, der *Zentralfleck*.

Fabric. Mantiss. p. 292. no. 15-16.

Alis anticis fuscescentibus; macula centrali
fulva, basi flavis.

— Spec. Inf. II. p. 279. no. 21.
In *Germania*.

23. *Asperana*, der *Rauhflügel*.

Fabric. Mantiss. p. 292. no. 35-36.

Alis anticis, basi albis, apice fuscis *scabris*.

— Spec. Inf. II. p. 284. no. 48.
Habitat *Hamburgi*.

24. *Duplana*, der *Doppelpunkt*.

Fabric. Mant. p. 293. no. 35-36.

Alis anticis pallidis; punctis duobus approxi-
matis baseos nigris.

— Spec. Inf. II. p. 284. no. 49.
Habitat *Kiliae*.

25. *Schestediana*, der *Schwarzflügel*.

Fabric. Mant. p. 293. no. 47-48.

Alis atris; macula magna communi, strigis
atomisque coerulescenti argenteis.

— Spec. Inf. II. p. 286. no. 64.
Habitat *Kiliae* in Alnetis.

26. *Schulziana*, der *Silberpunkt*.

Fabric. Mant. p. 293. no. 49-50.

Alis testaceis fasciis punctisque argenteis, me-
dioque litura atra.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 68.
In *Germania*.

27. *Lundana*, die *Goldspitze*.

Fabric. Mant. p. 294. no. 53-54.

Alis basi fuscis linea semicirculari pallida,
apice auratis; margine crassiori nigro pallido-
que striato.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 73.
In *Kiliae Quercu*.

28. *Applana*, der dreyfache Mittelpunkt.

Fabric. Mant. p. 294. no. 56-57.

Alis depressis fuscis; punctis tribus centrali-
bus albis.

— Spec. Inf. II. p. 288. no. 76.
Habitat *Kiloniae*.

29. *Bankiana*, der englische Waldwickler.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 275. no. 1.

Alis fuscis, fasciis duabus niveis, posteriore
unidentata.

In *Angliae Sylvis*.

30. *Smeathmannia*, die abgebrochene Binde.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 278. no. 13.

Alis exalbidis, fasciis duabus obliquis fuscis,
antere abbreviata, posteriore interrupta.

In *Anglia*.

31. *Forsterana*, der doppelte Randfleck.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 279. no. 18.

Alis anticis obscure cinereis, maculis duabus
marginalibus fuscis.

In *Angliae Nemoribus*.

32. *Stroemiana*, der doppelte Rückenfleck.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 280. no. 24.

Alis fuscis, maculis duabus dorsalibus cine-
reis.

In Germania.

33. *Cinchrana*, der *Aschwickler*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 281. no. 27.

Alis exalbido cinereis immaculatis, capite fulvo.

In Germania.

34. *Obliquana*, die *Schrägstreife*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 281. no. 28.

Alis cinereis, fasciis obliquis fulvis, albo-marginatis.

In Anglia.

35. *Fasciana*, die *Braunbinde*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 282. no. 35.

Alis anticis obscure cinereis, fascia media lituraque apicis fuscis.

In Angliae hortis.

36. *Ilicana*, der *schwarze Mittelpunkt*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 283. no. 44.

Alis anticis fusco-cinereis, punctis fuscis, centrali solitario atro.

In Angliae hortis.

37. *Tunbergiana*, der *schwarze Vierpunkt*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 284. no. 47.

Alis anticis cinereis, punctis quatuor elevato fasciculatis atris.

In Germania.

38. *Scabrana*, der *Höckerflügel*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 284. no. 54.

Alis anticis cinereis fusco subfasciatis scabris, margine exteriori postice exciso.

In

In *Angliae Quercu*.

39. *Teatiana*, der vierfache schwarze Randpunkt.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 286. no. 60.

Alis anticis griseis, macula punctisque duobus centralibus nigris.

In *Angliae Nemoribus*.

40. *Bicolorana*, der Weißgrünwickler. *)

Früesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 798. der Weißgrünwickler.

Röfels Insektenbel. IV. p. 73. t. 10. die glatte, grüne, mit einer kleinen Rückenwarze versehene, auf dem Eichenlaub lebende Raupe, mit ihrem besonders schönen grünen Papilion.

Wiener Schmett. p. 125. A. Grüne Blattwickler: no. 1. Eichengewicklerraupe (Quercus Roboris); Eichenwickler. T. Quercana.

Degeer Inf. Tom. I. Mém. 2. p. 58. t. 3. f. 1.

— *Tom. II. P. I. p. 410. no. 1.*

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabattues en toit, dont les supérieures sont vertes à deux lignes obliques jaunâtres, & les inférieures blanches.

Phalène verte bilinaire.

— *Uebers. II B. I Th. p. 296. no. 1. die grüne zweylinichte Phaläne.*

Geoffr. Inf. II. p. 172. no. 124.

Phalaena feticornis spirilinguis, humeris latis, alis viridibus, linea duplici transversa albida.

La Chappe verte à bande.

Long. 9 Lign.

Réaum. Inf. I. t. 39. f. 10 - 14.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 276. no. 4. Pyralis prasinana.

Alis

*) Vergl. mit *Prasinana* L. no. 285. welche *Fabric. Spec. Inf. II. p. 276. no. 5. Fagana* nennet,

Alis anticis viridibus, strigis duabus obliquis flavicantibus, posticis albis.

Habitat in *Alno*, *Quercu* Europae.

Larva viridis, linea laterali flavicante, segmento secundo dorsi tuberculato.

Pupa viridis, linea dorsali atra.

41. *Podana*, der *Oker gelbe Wickler*.

Scop. Ent. carn. p. 232. no. 583.

Alae ochraceae; anticae cinnamomeae; atomis strigaeque media fuscescentibus, apice caudatis.

In *Rhododendro ferrugin.*

Long. lin. $5\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.

42. *Rubiana*, der *Strauchwickler*.

Scop. Ent. carn. p. 233. no. 585.

Alae fuscescentes; anticae supra cinerascetes; macula communi postica subovata brunea, macula apicis punctisque tribus posticis crassiori margini impositis bruneis.

Long. lin. $4\frac{1}{4}$. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.

An *Viduana Mülleri*? *Zool. Dan. Pr.* p. 132. no. 1523.

Alis albo-cinereis, fasciis obliquis, maculaque marginali nigro punctata griseis.

43. *Fasciana*, die *Weißbinde*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 342. no. 1304.

Alis fusco-cinerascens; fascia alba.

In *Pomariis*.

Scop. Ent. carn. p. 233. no. 586.

Alae anticae supra fusco glaucoque variae; fascia lata albida postica.

Long. lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{2}$.

34 *Lepidoptera*. 233. *Phalaena Tortrix*.

44. *Cervana*, der *Hirschhornfarbige Wickler*.

Scop. Ent. carn. p. 234. no. 588.

Alae anticae *cervinae*; limbo ferrugineo et fusco-punctato; fascia fuscescente punctisque (3-4) glaucis variegata.

In *Ericetis*.

Long. lin. 5. Lat. $2\frac{1}{2}$.

45. *Lambergiana*, der *Rindenfarbige Wickler*.

Scop. Entom. carn. p. 234. no. 589.

Alae anticae *corticinae*; strigis transversis punctisque quatuor plumbeis.

Circa *Idriam*.

Long. lin. 4. Lat. $2\frac{1}{4}$.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1522. T. *Lambergiana*.

Alis nigricantibus maculis obscuris plumbeis.

46. *Wulfeniana*, der *Schwärzling*.

Scop. Ent. carn. p. 235. no. 590.

Nigricans, alis anticis plumbeo-punctatis; subtus puncto albo, quo posticae utrinque notatae.

Long. lin. 3. Lat. $1\frac{1}{2}$.

Circa *Idriam*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 132. no. 1521. T. *Wulfeniana*.

Alis nigricantibus; anticis punctis argenteis; posticis litura utrinque nivea.

47. *Rufana*, der *Fuchs*.

Scop. Ent. carn. p. 235. no. 591.

Alae anticae ferrugineae, glauco-punctatae.

In *Salicetis*.

Long. $4\frac{1}{2}$. Lat. $2\frac{1}{3}$.

48. *Plumbana*, der *Bleystrich*.

Scop. Ent. carn. p. 235. no. 592.

Alae anticae basi fuscescentes; posticae ferrugineae, *lituris transversis hamatis plumbeis*, punctisque (2 - 3) nigris marginalibus ad angulum posticum.

In *Herbidis*.

Long. lin. 4½. Lat. 2⅓.

49. *Ruficana*, der *Landmann*.

Scop. Ent. carn. p. 236. no. 593.

Alae anticae canescentes; maculis obsoletis fasciaque pallide caesatis.

Circa Tuguria et possessiones Rusticorum.

Long. 4 lin. Lat. 2.

50. *Miscellana*, der *Mischling*.

Scop. Ent. carn. p. 236. no. 594.

Alae anticae cervinae fusco-punctatae; strigis transversis interruptis plumbeis, fasciaque media fuscescente, plumbeo puncto notata.

In *Nemoribus, hortis, pomariis*, Majo.

Long. lin. 4. Lat. 2.

51. *Montana*, der *Bergmann*.

Scop. Ent. carn. p. 236. no. 595.

Alae anticae fuscae, macula communi media margineque crassiore postice ferrugineis, strigis binis posticis obliquis fimbriaque plumbeis.

In *montanis Carnioliae*.

Long. lin. 3. Lat. ½.

Wien. Schmett. p. 127. B. Metallichte Blattwickler: no. 14. Unbekannte Raupe; schwärzlicher Wickler, mit gelber Gemeinmakel, und silbernem Unterrande. T. Montana Scop.

36 *Lepidoptera. 233. Phalaena Tortrix.*

52. *Cana*, der *kleine Esel*.

Scop. Ent. carn. p. 236. no. 596.

Alae anticae canescentes, fronte atomisque cervinis.

Inter *Corylos*.

Long. lin. 6. Lat. 3.

53. *Pedana*, der *Nebelflügel*.

Scop. Ent. carn. p. 237. no. 597.

Alae anticae cinereo-fuscoque nebulosae, apice strigis obliquis ferrugineis.

Inter *frutices*.

Long. lin. 5. Lat. 2½.

54. *Umbriana*, der *Nachtschatten*.

Scop. Ent. carn. p. 237. no. 598.

Umbrina; alis anticis cinereis, fascia punctisque marginalibus fuscescentibus.

In *Pratis*.

Long. lin. 4. Lat. 2.

55. *Formosana*, der *Obstfreund*.

Scop. Ent. carn. p. 237. no. 599.

Alae anticae nigro-corticinoque variae, strigis tribus submarginalibus obliquis plumbeis, punctisque albis marginalibus.

Circa *Idriam*, in *Pomariis*.

Long. lin. 4. Lat. 2.

56. *Rivulana*, die *Bachlinie*.

Scop. Ent. carn. p. 237. no. 600.

Alae anticae murinae; fascia rivulisque posticis, albidis.

In *Sylvis*.

Long. lin. 4. Lat. 2.

Wien. Schmett. p. 131. E. Graue Blattwickler: no. 21. Unbekannte Raupe; grauer Wickler mit düstern Schrägstreifen. T. Rivulana Scop.

57. *Gramineana*, der *Grasling*.

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 601.

Alae anticae atomis fasciisque binis obsoletis fuscescentibus.

In herbidis collibus.

Long. lin. $3\frac{1}{2}$. Lat. $1\frac{3}{4}$.

58. *Capillitiana*, der *Buschkopf*.

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 602.

Alae anticae subferrugineae; punctis marginalibus capite palpisque albidis.

In Sylvestribus locis.

Long. lin. 4. Lat. 2.

59. *Osseana*, der *Beinfarbige Wickler*.

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 603.

Alae anticae osseae; atomis fuscis, punctoque apicis fuscescente.

In Herbidis.

Long. lin. $3\frac{1}{2}$. Lat. $1\frac{1}{2}$.

60. *Pyraliana*, der *Lichtfalterartige Wickler*.

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 604.

Alae anticae ferrugineae; limbo obscuriore, fasciisque binis fuscis.

In Sylvis.

Long. lin. 3. Lat. $1\frac{1}{2}$.

61. *Revoyana*, der *Krummrand*.

Scop. Ann. hist. nat. 5. p. 116. no. 130.

Alis superioribus glauco-virentibus, margine
exteriore notabiliter curvo.

Circa *Schemnitz*.

Alae anticae *Longit.* lin. 4-5.

Comes Petr. *Revay de Reva*.

62. *Schiffermulleriana*, der *Schiffermüllersche Wick-*
ler.

Scop. Ann. hist. nat. 5. p. 117. no. 131.

Parva; alis cinereo-murinoque variis.

In *hortis Schemnitzensibus*.

Alae anticae *Long.* lin. 3-4.

63. *Hochenwartiana*, der *Hochenwartische Wickler.*

Scop. Ann. hist. nat. 5. p. 117. no. 132.

Alis anticis fuscis, macula magna, lunata,
communi, media.

Schemnitzii in *hortis et pratis*.

Alae anticae *Long.* lin. 5-6.

64. *Cruciana*, das *Rostkreuz.*

Scop. Ann. hist. nat. 5. p. 118. no. 133.

Alae anticae flavae; singula cruce ferruginea.

Circa *Schemnitz* in *pratis*.

Alae anticae *Long.* lin. 4-5.

65. *Cingulana*, der *Gürtelwickler.*

Scop. Ann. hist. nat. 5. p. 118. no. 134.

Parva; murina; fascia alba supra basin.

Schemnitzii in *pratis*.

Alae anticae *Longit.* lin. 3-4.

66. *Miana*, der *Silberflügel.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 472.

Alis omnibus argenteis superioribus limbo fusco; lineaque undulata argentea.

In *Horto*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 131. no. 1518.

67. *Koenigiana*, der *Grauflügel*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 473.

Alis omnibus griseis politis; inferioribus strigata undulata.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1519.

In *Arvis*.

68. *Albana*, der *Weißling*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 474.

Alis omnibus albis; inferioribus apice fascia fusca.

In *Arundineto*.

— Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1520.

69. *Penniferana*, der *Federträger*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1527.

Alis sexpennibus cinereis, fasciis duabus punctisque marginalibus nigris.

Frisch Inf. III. p. 20. no. 10. t. 7. der 3ten Platte. f. 1-5.

Das kleine *Kaprifolium* blüträuplein mit seinem Zwiefalter.

70. *Aureana*, der *Goldrand*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1528.

Alis omnibus utrinque fuscis, margineque postico latiusculo, aureo.

71. *Miniana*, der *Röthling*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1525.

Alis superioribus miniatis; nodulo disci candido, triangulo marginali rufo.

72. *Circulana*, der *Zirkelwickler*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1526.

Alis fulvescentibus; macula dorsali communi ferruginea, striga alba cincta.

73. *Graminana*, der *Graswickler*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1529.

Alis omnibus utrinque cinereo-fuscis; basi maculis, disco lineis, altera bifida, altera curvata, transversis, albis.

74. *Olivana*, *Olivengrüner Wickler* mit 2 silbernen *Schrägestreifen*.

Wien. Schmett. p. 126. B. *Metallische Blattwickler*: no. 1. *Unbek. R.*

75. *Pilleriana*, *goldner W.* mit 2 braunen *Schrägestreifen*.

Wien. Schmett. p. 126. B. no. 2. *Unbekannte R.*

76. *Baumanniana*, *gelber Oranienstreifiger W.* mit *Silberstrichen*.

Wiener Schmett. p. 126. B. no. 6. *Unbek. R.*

77. *Tesserana*, *gelber rothfleckichter W.* mit *Silberstrichen*.

Wien. Schmett. p. 126. B. no. 7. *Unbek. R.*

Geoffr. Inf. II. p. 186. no. 10.

Tinea aurata, alis superioribus cruce decussata fusco-rubra.

La Teigne à croix de saint André.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lign.

78. *Badiana*, graugelber, rothbraunfleckichter *W.* mit Silberstrichen.

Wien. Schmett. p. 126. no. 8. Unbek. R.

79. *Woerberiana*, brauner *W.* mit Rothgold und Silber gezeichnet.

Wien. Schmett. p. 126. no. 9. Unbek. R.

80. *Penkleriana*, grau - und gelbgemischter *W.* mit Silberstreifen.

Wien. Schmett. p. 126. no. 12. Unbek. R.

81. *Lunulana*, braunschwarzer *W.* mit einem weißen Gemeinmonde und matten Silberstrichen.

Wien. Schmett. p. 127. B. no. 15. Unbek. R.

82. *Micana*, graubräunlichter und schwarzgemischter *W.* mit Silbersprecken.

Wien. Schmett. p. 127. B. no. 17. Unbek. R.

83. *Argentana*, ganz silberglänzender *W.*

Wien. Schmett. p. 127. B. no. 18. Unbek. R.

84. *Suttneriana*, bleichgelber *W.* mit einem Mittelpunkt.

Wien. Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattw. no. 2. Unbek. R.

85. *Costana*, Ledergelber *W.* mit zwey braunen Aussenrandmakeln.

Wien. Schmett. p. 127. C. no. 5. Unbek. R.

86. *Mediana*, Okergelber und braungezeichneter *W.*

Wien. Schmett. p. 128. C. Unbek. R.

87. *Viburnana*, *Mehlbaumwickler*.

Wien. Schmett. p. 128. C. no. 15. *Mehlbaumwickler-
ler-raupe* (*Viburni Lantanae*).

88. *Buoliana*, *Oranienfarbener Silberweißgegitterter W.*

Wien. Schmett. p. 128. C. no. 16. *Unbek. R.*

89. *Ferrugana*, *Rostbrauner Wickler*.

Wien. Schmett. p. 128. D. *Braune Blattwickler*:
no. 1. *Unbek. R.*

90. *Heparana*, *Leberfarbiger W. mit dunklen Strei-
fen*.

Wien. Schmett. p. 128. D. no. 3. *Unbek. R.*

Geoffr. Inf. II. p. 169. no. 118.

Phalaena feticornis spirilinguis, humeris la-
tis, ferrugineo-fusca, fasciis tribus transversis sa-
turationibus.

La Chappe brune.

Long. 4 lign.

Degeer Inf. Tom. I. Mém. 13. p. 409. 410. t. 27.
f. 9. 10.

— II. Part. I. p. 468. no. 2.

Phalène à antennes filiformes à trompe, à ai-
les larges d'un brun de Caffé, à bande oblique
obscur, à barbillons droits & allongés.

Phalène chappe brune du Lilas.

— *Uebers. II B. I Th.* p. 345. no. 2. *die braune
Mantelphaläne auf den Fliedern.*

*Hellgrüne sechzehnfüßige Raupe mit grünem
Kopfe.*

91. *Fulvana*, *Specklilienwickler*.

*Wien. Schmett. p. 128. D. no. 6. Specklilienwickler-
raupe (Lonicerae Periclymeni).*

92. *Rhombana, gelbbrauner W. mit zwey düstern
Flecken.*

Wien. Schmett. p. 128. D. no. 7. Unbek. R.

93. *Rufana, gelbröthlicher W. mit düsterer Außen-
randmakel.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 8. Unbek. R.

94. *Lipsiana, Leberbrauner W. mit weißen Mittel-
punkten.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 9. Unbek. R.

95. *Cristana, dunkelbrauner W. mit weißem Innen-
rande.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 10. Unbek. R.

96. *Scopoliana, Caffebrauner W. mit 2 weißglänzen-
den Bogenflächen.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 11. Unbek. R.

97. *Laevigana, hellbrauner W. mit dunkler Mitte.*

Wiener Schmett. p. 129. D. no. 12. Unbek. R.

98. *Pusillana, rothbrauner W. mit weißgestricheltem
Außenrande.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 13. Unbek. R.

99. *Striana, bräunlicher W. mit düstern Streifen.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 14. Unbek. R.

100. *Hohenwartiana, graubrauner (auch goldgel-
ber) W. mit silberfarbigen Untenrandhäkchen.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 15. Unbek. R.

101. *Politana*, glänzender goldbräunlicher *W.* ohne Makel.

Wien. Schmiett. p. 129. D. no. 16. Unbek. R.

102. *Mitterbacheriana*, Oraniengelb- und rothbrauner *W.* mit weißen Strichelchen.

Wien. Schmiett. p. 129. D. no. 17. Unbek. R.

103. *Tenerana*, weißlicht- und Zimmetbrauner *W.* mit feinen Punkten.

Wien. Schmiett. p. 129. D. no. 18. Unbek. R.

104. *Permixtana*, blaßbuntfarbiger *W.*

Wien. Schmiett. p. 129. D. no. 19. Unbek. R.

105. *Sparsana*, grauer röthlich gezeichneter *W.*

Wien. Schmiett. p. 129. E. Graue Blattw. no. 1. Unbek. R.

106. *Succedana*, hellgrauer *W.* mit bräunlichten Punkten und weißen Strichelchen.

Wien. Schmiett. p. 129. E. no. 2. Unbek. R.

107. *Cinifana*, weißer *W.* mit braunem Querbande und Flecken.

Wien. Schmiett. p. 129. E. no. 3. Unbek. R.

108. *Dilutana*, röthlichweißer *W.* mit blaßfarbigen Flecken.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 5. Unbek. R.

109. *Variegana*, gelblichtweißer *W.* mit düsterer Innenrandmakel und buntem Untenrande.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 6. Unbek. R.

110. *Ocellana*, weißlichter Wickler mit grauem Rücken und Innenwinkel.

Wien.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 7. Unbek. R.

111. *Asperana*, grauer *W.* mit bunthökrichten Flügeln.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 8. Unbek. R.

112. *Treueriana*, weißgrauhökrichter schwarzgefleckter (auch grünlichweißser) *W.*

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 10. Unbek. R.

113. *Pinana*, Fichtenwickler.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 11. Fichtenwickler-raupe (Pini Piceae etc. Clus.).

114. *Scabrana*, grauer *W.* mit düstern Hökern des Rückenwinkels.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 12. Unbek. R.

115. *Punctulana*, röthlichgrauer *W.* mit erhobenen schwarzen Punkten.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 13. Unbek. R.

116. *Consersana*, Perlfarbener *W.* mit blaugrauen Punkten und Strichelchen.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 14. Unbek. R.

117. *Strigulana*, Lichtgrauer dunkelspreckichter *W.*

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 15. Unbek. R.

118. *Steinkellneriana*, grauer *W.* mit schwarzem S.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 16. Unbek. R.

119. *Revayana*, grauer *W.* mit rothem Mittelpunkt.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 17. Unbek. R.

120. *Tumidana*, Lichtgrauer *W.* mit zwey röthlichen Schenkeln.

Wien.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 18. Unbek. R.

121. *Undulana*, grauer weislichtgeschlängelter *W.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 22. Unbek. R.

122. *Stagnana*, grauer lichtgewässerter *W.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 23. Unbek. R.

123. *Comitana*, dunkelgrauer weisgeschlängelter *W.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 24. Unbek. R.

124. *Asseclana*, braungrauer weisgefleckter *W.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 25. Unbek. R.

125. *Botrana*, Weintraubenwickler.

*Wien. Schmett. p. 131. E. no. 26. Weintraubenwick-
lerraupe (Botri).*

126. *Achatana*, grauer *W.* mit rothbraunen Flecken.

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 27. Unbek. R.

127. *Mygindiana*, grauer, abwärts feuerrothgestrich-
ter *W.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 28. Unbek. R.

128. *Corticana*, dunkelgrau und weisgefleckter *W.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 29. Unbek. R.

129. *Scutulana*, grauer *W.* mit zwei weislichen Flä-
chen.

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 30. Unbek. R.

130. *Linneana*, weislichgrauer *W.* mit einem schwar-
zen Mittelstrichelchen.

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 31. Unbek. R.

131. *Similana*, grauer *W.* mit zwei weislichen Flächen
und gestrichtem Aussenrande.

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 32. Unbek. R.

132. *Sinuana*, Mäusefahler W. mit einer weissen Innenrandmakel.

Wien. Schmiett. p. 131. E. no. 33. Unbek. R.

133. *Roborana*, Eichenbuschwickler.

Wien. Schmiett. p. 131. E. no. 34. Eichenbuschwicklerraupe (*Quercus Rob.*)

134. *Tripunctana*, schwarzgrauer W. mit weissem Mittelraume und drey schwarzen Pünktchen.

Wiener Schmiett. p. 131. E. no. 35. Unbek. R.

135. *Profundana*, düstergemischter W. mit weislicher Gemeinmakel.

Wien. Schmiett. p. 132. F. düstere Blattwickler: no. 1. Unbek. R.

136. *Trauniana*, schwarzer W. mit hochgelber Gemeinmakel.

Wien. Schmiett. p. 132. F. no. 3. Unbek. R.

137. *Iacquiniana*, braunschwarzer W. mit bleichgelbem Gemeinbände.

Wien. Schmiett. p. 132. F. no. 4. Unbek. R.

138. *Furvana*, grauschwarzer W. mit lichtgezeichnetem Untenrande.

Wien. Schmiett. p. 132. F. no. 5. Unbek. R.

139. *Inundana*, mattschwarzer weislich gewässerter W. mit weissem Mittelpunkte.

Wien. Schmiett. p. 132. F. no. 6. Unbek. R.

140. *Urticana*, Nesselwickler.

Wien. Schmiett. p. 132. F. no. 7. Nesselwicklerraupe (*Urticae dioicae*).

An Degeer Inf. II. Part. I. p. 470. no. 5.

Phalène Chappe à ailes béantes de l'Ortie?

— Tom. I. Mém. 13. p. 413. t. 28. f. 1. 2. 9. 10.

— Uebers. II B. I. Th. p. 473. no. 5. die Mantelpha-

phaläne auf den Nesseln mit aus einander stehenden Flügeln.

141. *Alniana*, Erlenwickler.

Wien. Schmett. p. 132. F. no. 8. Erlenwicklerraupe (Betulae Alni).

142. *Fuligana*, ganz düsterer Wickler.

Wien. Schmett. p. 132. F. no. 9. Unbek. R.

143. *Literana*, hochgrüner schwarzgezeichneter W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. A. no. 5. Unbek. R.

144. *Decimana*, gelber kreuzmaklichter W. mit Silberstrichen.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. Unbek. R.

145. *Trigonana*, Dottergelber W. mit bräunlichem Dreyecke.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. C. Unbek. R.

146. *Steineriana*, Skorpionsfennenwickler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. C. Skorpionsfennenwicklerraupe (Coronillae Emeri).

147. *Hermanniana*, Brombeerwickler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. D. Brombeerwicklerraupe (Rubi fruticosi).

148. *Pasquayana*, Elsebeerwickler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. D. Elsebeerwicklerraupe (Crataegi torminalis).

149. *Helvolana*, Weißwurzwickler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. D. Weißwurzwicklerraupe (Convallariae Polygonati).

150. *Gerningana*, goldbrauner schwarzrothstreifichter W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. D. Unbek. R.

151. *Campoliliana*, weißer, braun- und gelbsprenklichter W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. E. Unbek. R.

152. *Fluidana*, weißer, braunwellenstreifichter W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. Unbek. R.

153. *Lacunana*, bleichgrauer braunmaklichter W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. Unbek. R.

154. *Salviana*, Salbeywickler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. F. Salbeywickler-
raupe (*Salviae pratensis*).

155. *Merianana*, der hohe Brustschildwickler.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 470. no. 6. t. 9.
f. 16. 19.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à corcelet huppé, à ailes larges d'un brun verdâtre avec deux cercles ovales & trois lignes transverses grises.

Phalène chappe à corcelet à arrête.

Chenilles rases vertes à points blancs & à cinq rayes longitudinales blanches, dont celle du milieu est large.

— De grandeur mediocre.

— *Uebersf. II B. I Th.* p. 473. no. 6. t. 9. f. 16. 19.

Die Mantelphaläne mit einem kantigen Brustschilde.

Merian. Inf. Eur. t. 87.

156. *Mumetes*, der Sichelflügel.

Cramer Pap. exot. I. p. 128. t. 82. Fig. A. *Surin.*

Alis furvis; anticis falcatis flavo-lineatis.

157. *Marriana*, das braune Dreyeck.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 113. t. 348. Fig. F.Alis *anticis* sinuosis variegatis; maculis fuscis triangularibus; *posticis* luteis.158. *Renselariana*, das gelbe Bächlein.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 114. t. 348. Fig. H.Alis *anticis* flavo-rivulatis, maculis quatuor fulvis; *posticis* fusco-canis.159. *Crameriana*, der Buckelflügel.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 114. t. 348. Fig. I.Alis *anticis* gibbosis, margine rutilantibus, medio bilineatis; *posticis* fusco-canis.160. *Seppiana*, der fleischfarbige Wickler.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 135. t. 359. Fig. H.Alis concoloribus *incarnatis*; *anticis* margine exteriori fusco-maculato.161. *Holthufiana*, der Pommeranzenrand.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. H.Alis flavicantibus; *anticis* marginibus rutilantibus nigroque punctatis; *posticis* margine aurantiaco.162. *Meyeriana*, der Flimmerrand.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. K.*Incarnata*; marginibus nigro-ciliatis.163. *Gladbaghiana*, das Doppelstäbchen.*Cramer* Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. L.Alis *anticis* rubro-variegatis; *binis* flavo-rubroque bacillis.

164. *Demarriana*, der Schneeflügel.

Cramer Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. M.

Nivea; anticis rivulis transversis flavis sinuosis.

165. *Fuesliniana*, der Röthling.

Cramer Pap. exot. IV. p. 163. t. 372. Fig. E.

Rutilans, atro-punctata.

166. *Albertiana*, die gelbweisse Neune.

Cramer Pap. exot. IV. p. 163. t. 372. Fig. H.

Furva; alis anticis binis numeris 9 flavo-albis.

167. *Burmanniana*, der Mondrand.

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. H.

Lutescens; margine anticarum atro-lunulato.

168. *Gerningiana*, der Randpunkt.

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. I.

Testacea; punctulis nigris marginalibus.

169. *Walchiana*, der Weissrand.

Cramer Pap. exot. IV. p. 191. t. 384. Fig. F.

Alis olivaceo-micantibus, margine anteriore niveis.

170. *Thunbergiana*, der Bräunling.

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. H.

Alis anticis fuscis, brunneo-maculatis.

171. *Klemaniana*, der Weispunkt.

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. I.

Alis olivaceo - fuscis; albo - punctatis, posticis concoloribus brunneis.

172. *Esperiana*, der *Schwarzstrich*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. K.

Alis concoloribus, fusco - rubris, nigro - lituratis.

173. *Clerkiana*, der *weisse Dreyzack*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. M.

Alis anticis canescentibus, alba tripude marginali; posticis furvis, nigro - lineatis.

V. *Lichtmücken*, Pyralides. (*Zünsler*, Pinceurs.)

327. *Farinalis*, die *Mehlmücke*.

Müller L. N. S. 5 Th. I B. p. 731. *Feuerwürmlein* p. 732. no. 327. der *Polirflügel*.

Füesl. schweiz. Inf. p. 41. no. 808. Ph. *Pyralis*.

Wien. Schmett. p. 123. B. *Kurzschnauzigte Zünsler*, Ph. Pyr. *Brevipalpes*: no. 33. *Mehlzünsler-raupe* (*Farinae culinaris*). Pyr. *Farinalis* Linn.

Geoffr. Inf. II. p. 167. no. 113.

Phalaena feticornis spirilinguis triangularis, alis superioribus fusco - purpureis; fascia transversa albido - ferruginea, abdomen supra protendens.

La *Phalène à ventre relevé*.

Long. $4\frac{1}{2}$ Lign.

Réaum. Inf. II. t. 2. f. 4.

Bekm. Ep. S. L. p. 167. no. 327. Ph. Pyr. *Farinalis*.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 372. no. 18. Ph. Pyr. *Farinalis*.

Scop. Entom. carn. p. 240. no. 608.

Alae anticae basi et limbo caryophyllinis, media parte pallide cervina, marginibus repandis albidis.

Long. $5\frac{1}{2}$ lin.

Poda Mus. graec. p. 94.

Schaeff. Icon. t. 95. f. 8. 9.

Fabric. S. E. p. 641. *Phalaena* alis forficatis no. 112.

Ph. *Farinalis*.

Palpis recurvatis, alis politis, lutescentibus, strigis repandis albis, basi apiceque glaucis.

— *Spec. Inf.* p. 270. no. 169. Ph. *Farinalis*.

Sedens caudam erigit.

Mülleri Faun. Fridr. p. 54. no. 478. Pyr. *Farinalis*.

Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 132. no. 1530. Pyr. *Farinalis*.

N. L.

Cramer Pap. exot. IV. p. 112. t. 348. Fig. D. Pyr.

Farinalis *Linn.*

328. *Glaucinalis*, der Blauflügel.

Müller l. c. p. 732. no. 328. der Glattflügel.

Wien. Schmett. A. Langschnauzichte Zünsler, P.

Longipalpes. p. 120. no. 10. Unbek. R. Gelblicher Zünsler mit zwey Querstrichen. P. *Glaucinalis* *Linn.*

Die Querstriche kaum sichtbar.

Fabric. S. E. p. 641. no. 113. *Phalaena glaucinalis*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* p. 270. no. 172. N. L.

Clerk Phal. t. 5. f. 4.

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 479. Pyr. *glaucinalis*.

Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 132. no. 1531. Pyr. *glaucinalis*. N. L.

329. *Barbalis*, der *Langbart*.

Müller l. c. p. 732. no. 329. der *Schenkelbart*.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 809. *Ph. barbalis*.
Selten.

Pontopp. N. G. v. D. p. 221. t. 17.

Wien. Schmiett. p. 120. A. no. 9. *Kleezünsler* (Trifolii pratensis); *Kleezünsler*. *Pyr. barbalis*
Linn.

Raj. Hist. Inf. p. 227. no. 103. *Phalaena parva*, alis
latis, e fulvo utrinque albicantibus, nulla colo-
rum diversitate.

Scop. Ent. carn. p. 239. no. 605. *Pyr. barbalis*.

Alae omnes utrinque cinerascens; atomis
strigisque tribus. Antennae subpectinatae. Fe-
mora antica barbata.

Circa *Labacum*.

Long. lin. $6\frac{3}{4}$.

Fabric. S. E. p. 641. no. 114. *Phalaena barba-*
lis. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* p. 271. no. 171. N. L.

Clerk Phal. t. 5. f. 3.

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 476. *Pyr. barbalis*.
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 133. no. 1532. N. L.

330. *Tentacularis*, der *Langfühler*.

Müller l. c. p. 732. no. 330. der *Langfühler*.

Wien. Schmiett. p. 119. A. no. 2. *Butterblumzüns-*
ler (Leontodontis Taraxaci); *Butterblum-*
zünsler.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 32.

Fabric. S. E. p. 641. no. 115. *Phalaena tentacu-*
laris. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* p. 271. no. 172. N. L.

Degeer Inf. I. t. 5. f. 1.

— *Uebersf.* I. 1 Qu. p. 50. t. 5. f. 1.

— II. Part. I. p. 358. no. 12.

Phalène à antennes barbues, à trompe; à ailes horizontales d'un blanc sale avec deux lignes transverses d'un brun pâle, dont les barbillons de la tête égalent les antennes en longueur.

Phalène à très longs barbillons.

— *Uebersf.* II Th. I B. p. 260. no. 12. der *Langbart*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 54. no. 475. *Pyr. tentacularis*. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 133. no. 1533. *Pyr. tentacularis*. N. L.

331. *Proboscidalis*, der *Rüsselfühler*.

Müller l. c. p. 732. no. 331. der *Rüsselfühler*.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 810. *Phal. proboscidalis*. Nicht selten.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 26. no. 59.

Kleemanns Beytr. p. 265. t. 32. f. 1. 10.

Die grün hellgestreifte mit zarten Härchen und 14 Füßen besetzte springende *Spannraupe* der 3ten Klasse.

Ueber den gewölbten Netzförmigen Augen noch ein kleines rundes.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. VI. *Feuervöglein*.

Ph. *Pyr. Proboscidalis*. t. 23. f. 6. 7. 8.

Das Weibchen blasfer.

Wien. Schmett. p. 119. A. no. 1. Unbek. R. *Brauner*

Zünsler mit spitzigem Außenwinkel der Oberflügel. *Pyr. Proboscidalis* L. *)

D 4

Scop.

*) Da hier die Raupe als unbekannt angegeben wird; so scheinen die W. Entomologen die *Kleemannsche* wohl nicht für die *Probosc. L.* zu halten.

Scop. Ent. carn. p. 239. no. 606. Ph. Pyr. Proboscidalis.

Alae anticae supra cinereae, fasciis tribus fuscis; margine utrinque ferrugineo; postica in alae apice desinente; antennae subpectinatae.

In *Carniolia* non rara.

Long. lin. 6.

Fabric. S. E. p. 642. no. 116. Phal. Proboscidalis. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. p. 271. no. 173. N. L.*

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 477. Ph. Pyr. Proboscidalis. N. L.

— *Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1534. Ph. Pyr. Proboscidalis. N. L.*

332. *Rostralis*, die *Langschnauze*.

Müller l. c. p. 733. no. 332. t. 22. f. 15. die Langschnauze.

Frieslings Schweiz. Inf. p. 42. no. 811. Ph. Rostralis.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 580. no. 1. Ph. Pyralis, die Haynbüchenmotte; die dunkelgraue langschmäbliche Lichtmotte; auf Weißbüchen und Hopfen.

Wien. Schmett. H. p. 119. no. 3. Hopfenzünsler-raupe (Humuli Lupuli); Hopfenzünsler. Ph. Pyr. Rostralis L.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 463. no. 21. Hopfenzünsler.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 14. t. 6. das grüne Springräuplein auf dem Hopfen.

Raj. Hist. Inf. p. 214. no. 9.

Phalaena media e rufo cinerascens aut pulla, gemina proboscide sursum reflexa, alis exterioribus duplici transversa areola e rufo nigricante distinctis.

Geoffr.

Geoffr. Inf. II. p. 168. no. 116.

Phalaena seticornis spirilinguis, corniculis magnis cristatis, alis fusco-fumosis, medietate postica albidiore, punctis verrucosis eminentibus.

Le toupet à pointes.

Long. 6 lign.

Fabric. S. E. p. 642. no. 117. Phal. Rostralis. Nom. Linn.

Larva nuda, 14-poda, viridis; strigis obliquis lineisque lateralibus albis.

Pupa folliculata, brunnea, obtusa, antice carinata.

— *Spec. Insect. p. 271. no. 174. Nom. Linn.*

333. *Sulphuralis*, der Schwefelflügel.

Müller l. c. p. 733. no. 233. der Schwefelflügel.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 812. Phal. Sulphuralis. Bey uns selten.

Wien. Schmett. p. 93. Z. Halbspannraupen (Larvae Semigeometrae); reiche Eulen, Ph. Noctuae Metallicae: no. 6. Windeneulenraupe (Convoluti arvensis); Windeneule. N. Sulphurea (Pyralis Sulphuralis L.).

Beschäftigungen der Gesellsch. Naturf. Freunde zu Berlin. III. B. p. 37. t. 1. f. 7. Phal. Sulphuralis.

Schaeff. Icon. t. 9. f. 14. 15.

Fabric. Mantiss. p. 280. no. 83-84. Phal. Bombyx lugubris.

Alis deflexis flavis, rivulis punctisque atris; posticis fuscis.

— *Spec. Insect. p. 197. no. 116. Ph. B. lugubris.*

334. *Forficalis*, das Kohlvögelchen.

Müller l. c. p. 733. no. 334. der Kohlwurm.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 82. no. 813. Phal. Forfic-
alis.

Wien. Schmett. p. 122. B. Kurzschauzigte Zünsler:
no. 17. Meerrettigzünsler-raupe (Cochleariae Ar-
moraciae); Meerrettigzünsler. Ph. Forficalis
L.

Schaeff. Icon. t. 51. f. 8. 9.

Geoffr. Inf. II. p. 166. no. III.

Phalaena feticornis spirilinguis, triangularis;
alis deflexis flavis, lineis duabus ferrugineis obli-
quis.

La bande esquissée.

Long. 6 lign.

Syst. Natur. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 70. Pha-
léne du Chou.

Aët. Upsal. 1736. p. 24. no. 49.

Papilio alis planis pallidis nitidis.

Fabric. S. E. p. 642. no. 120. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. p. 272. no. 177. Nom. L. Phalaena*
Forficalis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 54. no. 484. Ph. P. Forfica-
lis. N. L.

— *Z. D. Pr. p. 133. no. 1535. Ph. P. Forficalis. N.*
L.

335. *Verticalis*, das Nesselvögelchen.

Müller l. c. p. 733. no. 335. der Nesselwurm.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 814. Ph. Verticalis.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 9. t. 4. der groß-
se grüne Blattwickler der größern Brennnessel.

Wien. Schmett. p. 120. B. no. 1. Nesselzünsler-rau-
pe (Urticae dioicae); Nesselzünsler. P. Vertica-
lis L.

Sulzers Kennz. der Inf. t. 16. f. 98. Ph. Purpura-
lis.

Bekmann

Bekmann Ep. S. L. p. 167. no. 335. P. *Verticalis*.
System. Natur. du Regne Anim. II. p. 153. no. 46.
Phalène de l'ortie.

Act. Upsal. 1736. p. 24. no. 50.

Papilio alis planis nitidis albidis, fasciis undulatis.

Fabric. S. E. p. 643. no. 121. Phal. *Verticalis*. *)

— *Spec. Insect.* p. 272. no. 180. Phal. *Verticalis*. **)

Larva 16-poda, pilosa, capite pedibusque flavis.

Pupa brunnea, segmentis tribus ultimis denticulo notatis.

Raj. Inf. p. 207. no. 48.

Phalaena parva ex albido sublutea, alis exterioribus duplici linea transversa nigricante, oblique ducta notatis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 54. no. 482. Pyr. *Verticalis*. N. L.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 133. no. 1536. P. *Verticalis*. N. L.

336. *Pingvinalis*, das *Fettvögelchen*. ***)

Müller l. c. p. 733. no. 336. der *Butterkeeter*.

Füesl.

*) Hierbey hat *Fabricius* des *Geoffroy* Inf. II. p. 166. no. 12. *La bande à l'envers*, angeführt; dieses ist aber der *Wiener* Pyr. *Palealis*. p. 123. no. 27.

**) Hier stehet auch noch der *Geoffroy* p. 166. no. 12.

***) Von der Raupe sagt *Linné*: habitat — rarius in *Ventriculo humano*, inter *Vermes pessima*. Es ist möglich, daß dergleichen Räumchen mit den Speisen in den Magen kommen, und allerley üble Zufälle erregen können; man verwechsle sie aber ja nicht mit den eigentlichen *Eingeweide- und Darmwürmern*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 815. Ph. pinguinalis.

Abhandl. der schwed. Akad. der Wiss. 17 B. 1755. p. 50. Rolanders Beschr. einer glatten Raupe mit 16 Füßen und getheilten Gelenken, welche von allerley Hausmannskost lebt. t. 2.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 13. Schmalzzünsler-raupe (Butyri aliorumque pinguium); Schmalzzünsler. P. Pinguinalis L.

Schaeff. Icon. t. 60. f. 8. 9.

Réaum. Inf. III. t. 20. f. 5.

Fabric. S. E. p. 643. no. 124. Phal. pinguinalis. N. L.

— *Spec. Inf. p. 273. no. 184. Ph. pinguinalis. N. L.*

Larva 16-poda, laevis, fusca, nitida.

Pupa nuda, brunnea, obscura.

Pontopp. N. G. v. D. p. 221. no. 64. Ph. pinguinalis.

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 479. Pyr. Pinguinalis. N. L.

— *Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1537. Pyr. Pinguinalis. N. L.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 371. t. 6. f. 11.

Phalène à antennes filiformes sans trompe, à barbillons allongés; à ailes horizontales d'un gris d'agate avec des rayes & des taches brunes & noires.

Phalène de la graisse.

— *Uebersf. II Th. I B. p. 271. t. 6. f. 11. die Feti-phaläne.*

337. *Frumentalis*, das Getreidevögelchen.

Müller l. c. p. 734. no. 337. der Getreidewurm.

Pallas

*Pallas Reisen I. Th. p. 81. *)*

Neueste Entdeckungen im Russ. Reiche. I. p. 217.

338. *Secalis*, das *Rockenvögelchen*. **)

Müller l. c. p. 734. no. 338. der Rockenwurm.

Lepechins Reise durch Russl. I. p. 81. Sie sollen von gekochtem Wermuthwasser sterben.

Schwed. Abh. 1752. 14t. B. p. 67. Rolander von der Raupe in den weissen Aehren.

Wiener Schmett. p. 78. M. Seitestreifenraupen; schwarzgezeichnete Eulen: no. 17. Rockenhalm-eulenraupe (Secalis cerealis intra culmos habitans); Rockenhalm-eule. Noctua Secalis L.

Fabric. S. E. p. 644. no. 125. Phal. Secalis. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. p. 273. no. 186. Phal. Secalis. Nom. L.*

An *Mülleri Faun. Fr. p. 46. no. 410? Ph. Noctua Secalis, spirilinguis cristata cinerea: thorace bipunctato, alis strigis maculisque tribus; subtus punctatis.*

In Spica Secalis.

— *Z. D. Pr. p. 124. no. 1425. Ph. N. Secalis.*

339. *Sanguinalis*, das *Blutband*.

Müller l. c. p. 734. no. 339. das Blutband.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 41. Unbek. R. Gelber Zünsler mit 2 rothen Querbinden. Pyr. Sanguinalis L. et p. 152.

Schaeff. Icon. t. 19. f. 16.

Fabric.

*) Die *Larven* fressen oft in Russland die Aecker rein ab. Das beste Mittel dagegen, die Felder, sobald die Saat aufgegangen, besonders bey feuchter Witterung, mit Asche von Buchweizen und Erbsenstroh bestreuet.

**) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 644. no. 126. Phal. Sanguinalis.
Nom. L.

— *Spec. Inf. p. 274. no. 188. Ph. Sanguinalis. N.*
L.

340. *Sticticalis*, der *Bartrand.* *)

Müller l. c. p. 734. no. 340. der Bartrand.

Fabric. S. E. p. 644. no. 127. Phal. Sticticalis.
Nom. L.

— *Spec. Inf. p. 274. no. 189. Phal. Sticticalis.*
N. L.

In Europa boreali.

341. *Reticularis*, der *Scheckrand.* **)

Müller l. c. p. 734. no. 341. der Buntbart.

Faun. Suec. ed. 2. p. 352. no. 1355. Ph. Pyr. Reticu-
laris.

342. *Purpuralis*, der *Purpurmantel.* ***)

Müller l. c. p. 735. no. 342. der Purpurmantel.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 42. Weisdornzünsler-
raupe (Crataegi oxyac.); Weisdornzünsler. Pyr.
Purpuralis L.

Fabric. S. E. p. 644. no. 131. Phal. purpuralis. Nom.
Linn.

— *Spec. Inf. p. 275. no. 194. Phal. purpuralis.*
N. L.

Variat rarius alis fuscis flavo-maculatis.

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 483. Ph. Pyr. purpura-
lis. N. L.

— *Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1538. Ph. Pyr. purpu-*
ralis. N. L.

343 *Du-*

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

343. *Duplaris*, der Doppelpunkt. *)

Müller l. c. p. 735. no. 343. der *Parallelpunkt*.

Mülleri Z. D. Pr. p. 133. no. 1539. Pyr. *Duplaris*.
N. L.

— *Faun. Fridr.* p. 55. no. 485. Phal. *Tinea dupla-*
ris. N. L.

Unabgebildete Linnéische Lichtmücken.

1. no. 338. *Secalis*.
2. no. 340. *Sticticalis*.
3. no. 341. *Reticularis*.
4. no. 342. *Purpuralis*.
5. no. 343. *Duplaris*.

Neue Arten von Lichtmücken.

1. *Nemoralis*, die *Waldlichtmücke*.

Fabric. S. E. p. 642. no. 118.

Palpis recurvatis, alis griseis; strigis tribus
fuscis; intermedia flexuosa.

In Angliae *Nemoribus*.

— *Spec. Inf.* p. 271. no. 175.

Harris *Inf. Angl.* t. 6. f. 2?

2. *Palpalis*, die *geradschnauzige Lichtmücke*.

Fabric. S. E. p. 642. no. 119.

Palpis porrectis, thorace longioribus, alis gri-
seis; posticis margine crassiori albo.

Habitat in *Anglia*.

— *Spec. Inf.* p. 271. no. 176.

3. *Fuscalis*, das *Weissauge*.

Fabric. S. E. p. 643. no. 122.

Palpis

*) Nicht abgebildet.

64 *Lepidoptera. 233. Phalaena Pyralis.*

Palpis recurvatis, alis fuscis, nitidis; anticis puncto subocellari niveo. In *India orientali*.

Fabric. Spec. Inf. p. 273. no. 182.

4. *Dorsalis*, die *braune Rückenlinie*.

Fabric. S. E. p. 643. no. 123.

Palpis recurvatis; alis cinereis, linea dorsali fasciaque postica fuscis. In *Brasilis*.

— *Spec. Inf. p. 273. no. 183.*

5. *Fascialis*, die *Doppelbinde*.

Fabric. S. E. p. 644. no. 128.

Palpis recurvatis, alis fuscis, fasciis duabus flavis.

In *Nova Hollandia*.

— *Spec. Inf. p. 274. no. 190.*

6. *Recurvalis*, die *Weissbinde*.

Fabric. S. E. p. 644. no. 129.

Palpis recurvatis, alis fuscis; anticis fasciis duabus albis; posteriore abbreviata.

In *India orientali*.

— *Spec. Inf. p. 274. no. 192.*

7. *Punctalis*, der *Weissrand*.

Fabric. S. E. p. 644. no. 130.

Alis subferrugineis, striga flava, margine crafiori albo punctato.

— *Spec. Inf. p. 275. no. 193.*

In *Europae borealis Nemoribus*.

8. *Costalis*, der *Rippenfleck*.

Fabric. S. E. p. 644. no. 132.

Alis purpurascentibus; maculis duabus costalibus, margineque postico flavis. In *Anglia*.

Fabric.

Fabric. Spec. Inf. p. 275. no. 196.

9. *Dentalis*, die *Purpurbinde*.

Fabric. S. E. p. 645. no. 134.

Alis flavis; falcia purpurea.

In *India orientali*.

— *Spec. Inf. p. 275. no. 198.*

10. *Undalis*, die *Wasserbinde*. *)

Fabric. Spec. Insect. p. 272. no. 178.

Alis obscure cinereis, strigis tribus obliquis undatis niveis.

In *Italia*.

11. *Ferrugalis*, die *Rostbinde*.

Fabric. Spec. Inf. p. 273. no. 185.

Alis flavis, strigis tribus undatis ferrugineis.

In *Africa aequinoctiali*.

12. *Nivealis*, der *Schneebauch*.

Fabric. Spec. Inf. p. 274. no. 187.

Alis griseo-fuscis, maculis duabus costalibus albis, corpore niveo.

In *Germania*.

13. *Strigalis*, die *Purpurader*.

Fabric. Spec. Inf. p. 274. no. 191.

Alis griseis, strigis duabus flavis costaque purpurascente.

In *Germaniae Nemoribus*.

14. *Ver-*

*) Die Noctnam *Sagittam*, S. E. p. 597. no. 3. hält *Fabric.* nun selbst in seinen *Spec. Inf. p. 272. no. 179.* für eine *Phalaenam* oder *Pyralidem* L. Palpis recurvis, alis cinereis, macula costali atra, posticis flavis, margine fusco: *Phalaena Sagittalis*.

Caput acuminatum.

66 *Lepidoptera*. 233. *Phalaena Pyralis*.

14. *Verrucalis*, die *Dreywarze*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 484.

Palpis porrectis, alis albis, lineis duabus nigris acutis; *verrucis tribus*.

In *Pariete*.

— Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1540. Ph. Pyr. *Verrucalis*.

15. *Anthracinalis*, der *Köhler*.

Scop. Ent. carn. p. 239. no. 607.

Tota nigra; alis anticis albo-maculatis. Antennae mari pectinatae.

Circa *torrentes*. Long. lin. $6\frac{1}{2}$.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 46. *Schwarzer Zünsler mit viel weißen Fleckchen*. P. *Anthracinalis*

Scop. Die *Raupe* ist entdeckt. S. *Nachtrag* p. 317.

16. *Citrinalis*, die *Zitrongelbe Lichtmücke*.

Scop. Ent. carn. p. 240. no. 609.

Alae citrinae; posticae pallidiores immaculae; anticae fascia submarginali et cratere sanguineo reticulatae.

Circa *Idriam*.

Palpi lin. $1\frac{1}{2}$ longi.

Long. lin. 4.

17. *Trabealis*, der *schwarze Balken*.

Scop. Ent. carn. p. 240. no. 610.

Alae anticae paleaceae; fasciis binis; *trabe* longitudinali maculisque (5) nigris.

Labaco mortuam accepi.

Long. lin. $4\frac{1}{2}$.

18. *Cristalis*, der *schwarze Busch*.

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 611.

Alae fuscae; anticae supra ferrugineo fusco-
que nebulosae; *crista* nigricante in medio no-
tatae.

Circa *Idriam*.

Long. lin. $3\frac{1}{2}$.

19. *Lunalis*, das braune Mündgen.

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 612.

Alae cervinae; anticae strigis tribus obsoletis
lunulaque fuscis.

Labaci degit.

Long. lin. $6\frac{1}{2}$.

20. *Viminalis*, die Bindweiden-Lichtmücke.

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 613.

Alae murinae, fascia obscuriore utrinque.

In aut circa *Salicem viminalem*.

Long. lin. 5.

21. *Extimalis*, die Rostspitze.

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 614.

Alba; alis anticis apice ferrugineis.

In agro *Labacensi*.

Long. lin. 5.

22. *Sericealis*, der Seidenglanz.

Scop. Ent. carn. p. 642. no. 615.

Tota subossea, sed *Serici* in modum nitens;
alis anticis macula obsoleta fuscescente.

In agro *Labacensi*.

Long. lin. 4.

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 18. *Unbek. R. Hell-
okergelber Zünsler mit einem schwarzen Mond-
fleckchen. P. Sericealis Scop.*

23. *Ruralis*, der Landmann.

Scop. Ent. carn. p. 242. no. 616.

Alae paleaceae, strigis transversis, undulatis, obsoletis, fuscis.

Ruri degit.

Long. lin. 7.

24. *Trivialis*, der gemeine Mann.

Scop. Ent. carn. p. 642. no. 617.

Alae paleaceae; anticae supra fascia lineis tribus obscurioribus composita, ab alae margine inferiore nata et in apicem desinente.

Vulgaris apud nos in hortis et pratis.

Long. lin. 6.

25. *Nemoralis*, die Waldnymph.

Scop. Ent. carn. p. 642. no. 618.

Alae anticae basi osseae, venulis paleaceis reticulatae, limbo paleaceo, parte intermedia vinaceae, margine externo repando.

In *Nemoribus* frigidis umbrosis.

Long. lin. 5.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 34. Unbek. R. Gelb- und düsterröthlicher Zünsler mit weiß- und braun-gezähntem Saume. P. Nemoralis Scop.

26. *Majalis*, die Maylichtmücke.

Scop. Ent. carn. p. 643. no. 619.

Alae anticae supra albae; fasciis tribus, interruptis, fuscescentibus. Pectus pedesque argentei, tibiis fusco-annulatis.

In pratis *Majo* M.

Long. lin. 4.

27. *Luteolaris*, die Leimfarbige Lichtmücke. *)

Scop.

*) *Ib. no. 136. Phal. priori simillima, sed absque palpis porrectis, et linea longitudinali, marginali fusco-lutea evidentiore.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 118. no. 135.

Pallide lutea, palpis thorace longioribus, ad-
scendentibus.

In Hungariae pratis montanis.

Long. lin. 5-6.

28. *Tinealis*, einwärts bleicher, auswärts düstrer
Zünsler.

Wien. Schmiett. p. 119. A. no. 4. Unbek. R.

29. *Decimalis*, mit einem weißlichten X bezeichneter
Zünsler.

Wien. Schmiett. p. 119. A. no. 5. Unbek. R.

30. *Bombycalis*, gelbbrauner Zünsler mit gelbgeran-
detem Querbande.

Wien. Schmiett. p. 120. A. no. 6. Unbek. R.

31. *Angustalis*, braunrother Zünsler mit schmalen
Oberflügeln.

Wien. Schmiett. p. 120. A. no. 7. Unbek. R.

32. *Curtalis*, blaßoraniengelber Zünsler mit rothbrau-
nen Querstrichen.

Wien. Schmiett. p. 120. A. no. 8. Unbek. R.

33. *Grisealis*, Lichtgrauer Zünsler mit drey Querstri-
chen.

Wien. Schmiett. p. 120. A. no. 11. Unbek. R.

34. *Emortualis*, grünlichgrauer Zünsler mit 2 gelben
Querstrichen.

Wien. Schmiett. p. 120. A. no. 12. Unbek. R.

35. *Dentalis*, Olivengrünlicher zackicht gezeichneter
Zünsler.

Wien. Schmiett. p. 120. A. no. 14. Unbek. R.

36. *Repandalis*, glänzender weißlich- und graugewäsfertiger Zünsler.

Wien. Schmett. p. 120. B. no. 2. Unbek. R.

37. *Triquetralis*, glänzendweißlicher Zünsler mit 2 Wellenstrichen und einem Dreyeck.

Wien. Schmett. p. 120. B. no. 3. Unbek. R.

38. *Politalis*, Strohgelber und Kupferbrauner Zünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 4. Unbek. R.

39. *Verbascalis*, der Wollkrautzünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 5. Wollkrautzünsler-raupe (*Verbasci Thapsi*).

40. *Lancealis*, glänzendgrauer Zünsler mit Lanzenförmigen Oberflügeln.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 6. Unbek. R.

41. *Flavalis*, glänzender hellgelber Zünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 7. Unbek. R.

42. *Fuscalis*, glänzender graubräunlicher Zünsler mit blassen Wellenstrichen.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 8. Unbek. R.

43. *Polygonalis*, Wegetrittzünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 9. Wegetrittzünsler-raupe (*Polygoni avicularis*).

44. *Elutalis*, glänzendweißer blaßbraun gerandeter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 10. Unbek. R.

45. *Prunalis*, Schlehenzünsler.

Wien.

*Wien. Schmett. p. 121. B. no. 11. Schlehenzünsler-
raupe (Pruni spinosae).*

46. *Sambucalis*, der *Holderzünsler*.

*Wien. Schmett. p. 122. B. no. 14. Holderzünsler-
raupe (Sambuci nigrae).*

47. *Literalis*, brauner Zünsler mit weissen Zügen.

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 15. Unbek. R.

48. *Salicalis*, der *Weidenzünsler*.

*Wien. Schmett. p. 122. B. no. 16. t. I. b. f. 5. Wei-
denzünsler-raupe (Salicis Triandrae etc.). t. I. a.
f. 5.*

49. *Lunatralis*, graulichter Zünsler mit einem schwar-
zen Mondfleckchen.

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 19. Unbek. R.

50. *Olivalis*, glänzender Olivenbräunlicher Zünsler
mit weissen Mittelzeichen.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 21. Unbek. R.

51. *Corticalis*, hellbrauner, weiss und schwarz gestrich-
ter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 22. Unbek. R.

52. *Alpinalis*, glänzender grauer Zünsler mit weisser
Mittelmakel.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 24. Unbek. R.

53. *Punctalis*, Quittengelblicher Zünsler mit einem
weissen Punkt.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 25. Unbek. R.

54. *Aenealis*, bräunlichtgrauer, Kupferschielender
Zünsler.

Wien. Schmiett. p. 123. B. no. 26. Unbek. R.

55. *Palealis*, blafsgrünlichtgelber Zünsler.

Wien. Schmiett. p. 123. B. no. 27. Unbek. R.

Geoffr. Inf. II. p. 166. no. 112.

Phalaena seticornis spirilinguis triangularis,
alis deflexis albo-virescentibus, subtus lineis
duabus transversis nigris.

La bande à l'envers.

Long. 7 lign.

56. *Ochrealis*, hellokergelber Zünsler.

Wien. Schmiett. p. 123. B. no. 28. Unbek. R.

57. *Margaritalis*, glänzender Perlfarbiger Zünsler.

Wien. Schmiett. p. 123. B. no. 29. Unbek. R.

58. *Cespitalis*, gelb, braun und grauneblicher Zünsler
 mit gelblichen Querstrichen der Unterflügel.

Wien. Schmiett. p. 123. B. no. 32. Unbek. R.

59. *Flammealis*, gelber Zünsler mit Fleischfarbichtem
 Rande.

Wien. Schmiett. p. 123. B. no. 35. Unbek. R.

60. *Rubidalis*, Purpurbrauner Zünsler mit 2 gelben
 Querstrichen.

Wien. Schmiett. p. 124. B. no. 36. Unbek. R.

61. *Regalis*, glänzender braunrother Zünsler mit 2
 silbernen halben Querbinden.

Wien. Schmiett. p. 124. B. no. 37. Unbek. R.

62. *Fimbrialis*, Purpurfarbiger Zünsler mit goldgel-
 bem Untenrande.

Wien. Schmiett. p. 124. B. no. 38. Unbek. R.

63. *Auroralis*, gelber Zünsler mit Purpurstreifen.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 39. Unbek. R.

64. *Pudoralis*, der Zünsler mit weißen rosenroth gefleckten Oberflügeln.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 40. Unbek. R.

65. *Quadripunctalis*, Purpurschwarzer Zünsler mit vier gelben Fleckchen.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 43. Unbek. R.

Geoffr. Inf. II. p. 195. no. 33.

Tinea fusco-rubra, alis superioribus maculis duabus croceis transversim positis.

La Teigne à deux taches jaunes en bande.

Long. 3 lign.

66. *Pollinalis*, schwarzer, weißgefleckter und bestäubter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 44. Unbek. R.

67. *Guttalis*, schwarzer Zünsler mit 8 weißen Fleckchen.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 45. Unbek. R.

68. *Nivalis*, schimmernd weißer bräunlicht gewässerter Zünsler. *)

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. A. no. 46. Unbek. R.

69. *Trinalis*, hochgelber dreymaklichter Zünsler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. no. 47. Unbek. R.

*) Die *Pyr. Calvarialis*, schwarzbrauner Zünsler mit gelbem schwarzgezeichnetem Mittelflecke, ist schon vorher ihre *N. Calvaria*; wie auch p. 317. *P. Marginalis* ihre *N. Marginea*.

74 *Lepidoptera*. 233. *Phalaena Pyralis*.

70. *Punicealis*, rother gelbgefleckter Zünsler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. no. 49. Unbek.
R.

71. *Porphyralis*, schwärzlichrother gelbgestrich- und
punktirter Zünsler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. no. 50. Unbek.
R.

72. *Aufonia*, die Surinamische *Aufonia*.

Cramer Pap. exot. II. p. 66. t. 140. Fig. C.

Alis incarnatis, ciliatis; anticarum dextra li-
neola curva atra.

73. *Flegia*, die Surinamische *Flegia*.

Cramer Pap. exot. II. p. 66. t. 140. Fig. D.

Alis concoloribus niveo-perlaceis; anticarum
margine exteriori pallide glaucis.

74. *Chorebus*, der Surinamische *Chorebus*.

Cramer Pap. exot. II. p. 25. t. 113. Fig. D.

Alis anticis falcatis fuscis, lineis transversis
incarnatis; posticis obscurioribus.

75. *Diaphana*, der afrikanische *Durchschein*.

Cramer Pap. exot. II. p. 26. t. 113. Fig. G.

Alis niveis, atro-punctatis, lineisque transver-
sis luteis.

76. *Politia*, die afrikanische *Politia*.

Cramer Pap. exot. II. p. 35. t. 120. Fig. A.

Alis niveis, rubro-micantibus; anticis margi-
ne anteriore luteo.

77. *Nitocris*, die Surinamische *Nitokris*.

Cramer Pap. exot. III. p. 148. t. 275. Fig. A.

Alis

Alis olivaceis concoloribus; anticis margine anteriore rubro-punctatis, lineaque longitudinali communi atro-liturata; posticis lunulis olivaceis marginalibus.

78. *Pueritia*, die *Koromandelsche Pueritia*.

Cramer Pap. exot. III. p. 128. t. 164. Fig. E.

Alis fuscis; anticis apice et margine exteriori; posticis pariter maculis nigris, glauco-punctatis.

79. *Tedea*, die — *Tedea*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 48. t. 312. Fig. G.

Alis anticis testaceis, posticis incarnatis; omnibus maculis argentaceis.

80. *Sulphuralis*, der *Schwefelflügel*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 113. t. 348. Fig. E.

Tota sulphurea; alis anticis, binis lineis transversis, punctisque argenteis.

81. *Bilineata*, die *Doppellinie*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. I.

Alis anticis, pulchre rubris, singula flavo-bilineata.

82. *Margaritaria*, das *goldne V*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 150. t. 367. Fig. K.

Alis violaceis, litteris V aurantiacis.

Clerk Icon. t. 51. f. 3. 4.

83. *Procopia*, die *Surinamische Prokopia*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 152. t. 368. Fig. E.

Alis violaceis, albo-striatis, basi aurantiacocanis.

84. *Marginalis*, der *Surinamische Olivenrand*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 160. t. 371. Fig. D.

Triangularis; alis albescentibus nigro-striatis, margine lato-olivaceo.

Merian. Surin. t. 41. f. 2.

85. *Venustalis*, die *Surinamische Venustalis*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 162. t. 371. Fig. I.

Alis anticis flavescentibus, nigro-serpentulatis; posticis aurantiacis.

86. *Reginalis*, die *Surinamische Schwarzbinde*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 163. t. 372. Fig. C.

Alis incarnatis, anticis aterrimae fasciatis.

87. *Vicinalis*, die *Surinamische Shecke*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. G.

Flavo-rubro-furvoque variegata.

88. *Floralis*, das *Surinamische Blümchen*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 191. t. 384. Fig. G.

Hilare rutilans, binis anticarum fasciis albis.

89. *Houttuinialis*, die *Houttuinische Lichtmücke*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. L.

Nigra, aurantiaco-maculata.

VI. *Motten*, Phal. *Tineae*. *)

344. *Gelatella*, die *Kerbelmotte*. **)

Mül-

*) Es ist merkwürdig, dass bey dem Mottengeschlecht die Weibchen einiger Arten Flügellos sind. Ich nenne dies Geschlecht *Motten*, um es von den *Schaben*, *Blattis*, zu unterscheiden. Zu diesen *Motten* gehören die *Minirer*, *Vers mineurs*; *Larvae Subcutaneae*.

**) Da *Linné* selbst dieser Motte den Geschlechtsnamen *Tinea* beyge-

Müllers Erkl. des Linn. Natursyst. Vten Th. Iter B. p. 735. no. 344. der *Apfelschäler*. *)

Martini allgem. Gesch. der Nat. in alphab. Ordn. III B. p. 129. *Apfelschäler*.

Wien. Schmett. p. 144. D. Schnauzenlose Schaben, Ph. *Tineae Impalpes*, mit gespitzten Oberflügeln: no. 38. *Rothweidenschabenraupe* (*Salicis purpureae*); *Rothweidenschabe*. Ph. T. *Gelatella* L. Fem. *Hemiptera*.

Clerk Phal. t. 8. f. 3.

345. *Sociella*, die gesellschaftliche Honigmotte.

Müller l. c. p. 735. no. 345. die *Honigmotte*.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 345. T. *Gelatella*.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 95. Le plus grand de tous ceux nommés: *nasutae* par *Linnaeus*.

Fabric. S. E. p. 656. no. 3. *Tinea Sociella*.

Alis oblongis, cinereis, antice albidis, postice pallidis, striga undata, nigra.

— *Spec. Inf.* p. 289. no. 3. T. *Sociella*.

Clerk Phal. t. 3. f. II.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 466.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe; à ailes roulées d'un blanc cendré avec des atomes bruns, & deux rayes obliques brunes.

Phaléne à ailes à rouleau applati.

Degeer

beygesetzt hat; so habe ich sie von den *Blattwicklern* abgesondert, und zu den *Tineis* gesetzt.

*) Die Uebersetzung in dem Müllerschen Kommentar ist sonderbar: „dieses Insekt pflegt sich gerne bey den vom Tische getragenen *Aepfelschaalen* einzufinden.“

Linn. Habitat in *Pomariis sub mense defoliationis*. In den Obstkammern, um die Zeit, oder in dem Monat, wenn die Blätter fallen.

Degeer Ueberf. II Th. I B. p. 343. no. 4. die *Phaläne* mit flachgerollten Flügeln.

346. *Colonella*, die *Kolonmotte*.

Müller l. c. p. 736. no. 346. das *Kolon*.

Wiener Schmett. p. 133. B. Geradschnauzigte Schaben, Ph. T. *Directipalpes*, mit stumpfen Oberflügeln: no. 1. Unbek. Raupe; röthlichgraue Schabe mit schwarzem Mittelpunkte. T. *Colonella* L. Groß, und gleicht einer *Eule* (*Noctua*).

Neuer Schaupl. der Natur II. p. 193. Ph. *Colonella*. *Fabric.* S. E. p. 655. no. 2. T. *Colonella*. Nom. *Linn.*

Puncta duo atra ad marginem crassiores.

— *Spec. Inf.* II. p. 289. no. 2. T. *Colonella*.

Clerk Phal. t. 3. f. 8.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 163. no. 102. *Phalène des Jardins*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1541. Ph. T. *Colonella*. Nom. L.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 467. no. 5.

Phalène à antennes filiformes, à trompe; à ailes roulées d'un gris d'agate avec deux rayes ondées noirâtres, & un point noir au milieu.

Phalène agathe à ailes roulées à point noir.

— *Ueberf.* II Th. I B. p. 342. no. 5. die Achatfarbige *Phaläne* mit zusammengerollten Flügeln und schwarzem Punkt.

347. *Pusiella*, die *Zahnlinie*.

Müller l. c. p. 736. no. 347. der *Zahnstrich*.

Füesl. schweiz. Inf. p. 42. no. 816. Ph. *pusiella*. Bey Zürich selten.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 9. der *Zahnstrich*.

Fabric.

Fabric. S. E. p. 656. no. 6. T. Pusiella. Nom. Linn.
In Germaniae arvis.

— *Nov. Spec. Inf. p. 291. no. 8. T. Pusiella.*

348. *Bella, das punktirte Band.*

Müller l. c. p. 736. no. 348. das Punktband.

Raj. Hist. Inf. p. 211. no. 1.

*Phalaena minor fulva, maculis nigris, alba
 linea pulchre aspersis.*

Linn. Mus. L. V. p. 399. no. 34.

Fabric. S. E. p. 585. no. 101. Ph. Bombyx bella.
Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 203. no. 141. Ph. B. bella.*

Drury Illustr. of nat. hist. I. t. 24. f. 3.

Cramer Pap. exot. P. I. t. 109. Fig. CD.

349. *Pulchella, der Blutpunkt.*

Müller l. c. p. 736. no. 349. der Blutpunkt.

Lepechins Reise durch Rußl. P. I. p. 302.

*Glabachs neue Schmett. t. 15. f. 5. 6. der Blut-
 punkt.*

*Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 11. der
 Blutpunkt.*

*Wien. Schmett. p. 67. C. Spindelraupen, Larvae
 Fusiformes; Schabenartige Eulen, Ph. Noctuae
 Tineiformes: no. 9. Sonnenwendeeulenraupe
 (Heliotropii europ. etc.); Sonnenwendeeule; No-
 ctua Pulchra. Tinea Pulchella L.*

Schaeff. Icon. t. 122. f. 1.

*Fabric. S. E. p. 586. no. 102. Ph. Bombyx pulchel-
 la. Nom. Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 203. no. 142. Ph. B. pulchella.*

*Cramer Pap. exot. P. I. p. 108. t. 109. Fig. EF. Ph.
 Lotrix.*

Scop. Ent. carn. p. 208. no. 514. Phal. pulchella.

Alba;

Alba; alis anticis nigro-rubroque punctatis;
posticis limbo fusco.

In flore *Scabiosae arvensis*.

Long. lin. $7\frac{1}{3}$. Lat. $3\frac{1}{3}$.

350. *Evonymella*, die *Spillbaumotte*. *)

Müller l. c. p. 736. no. 350. die *Spillbaumotte*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 817. Ph. *Evonymella*.

— Magaz. der Entomol. II B. p. 39. Ph. *Evonymella* — die Raupen derselben haben viele *Zwirnwürmer*.

Röfels Insektenbel. I B. NV. 4te Kl. p. 19. t. 8. die gelbe gefellige *Heckenschabe*.

Maders (Kleemanns) Raupenkalender p. 61. no. 171. die *Spillbaumotte*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 395. no. 1. Ph. T. *Evonymella*, die *Spindelstrauchmotte*.

Die Oberflügel weiß mit 50 schwarzen Punkten, und unten braun.

Glafer von schädlichen Raupen (neue Ausg.) p. 44.

Raupe des punktirten Nachtschmetterlings, Ph. *Evonymella*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 23. *Spindelbaumotte*.

Wien. Schmett. p. 138. C. *Krummschnauzichte Schaben*, Ph. T. *Recurvipalpes*: no. 18. *Spindelbaumschabenraupe* (*Evonymi Europaei*); *Spindelbaumschabe*. T. *Evonymella* L.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 350. Ph. T. *Evonymella*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 358. die *Spillbaumotte*.

Catholicon E. p. 311. *Evonymella*.

System.

*) Das Linnéische Zitatum: *Frisch* V. t. 16. gehört nicht hieher, sondern zu der folgenden, *Padella*.

System. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 81.

Phalène de Chenille, qui vit en commun sur le Poirier, le Cerisier, & autres arbres, & qui en ravage toutes les feuilles.

Réaumur Inf. II. t. 12. f. 12. 13. I. t. 17. f. 10. 11.

La Chenille du *Fusain*; le *petit deuil*.

Raj. Hist. Inf. p. 196. Phalaena parva, alis longis, lividis seu plumbeis, exterioribus punctis nigris, inferioribus fuscis.

Act. Upsal. 1736. p. 26. no. 81. Papilio alis depressis argenteis, nigro-punctatis.

Scop. Entom. carn. p. 241. no. 631. Ph. T. Evonymella.

Alae anticae supra albae, punctis nigris ad (27).

Long. lin. 5 $\frac{1}{4}$.

Fabric. S. E. p. 656. no. 4. Ph. T. Evonymella.

Nom. *Linn.*

Larva gregaria, nuda, flava, nigro-punctata, sub tentorio communi.

Pupa folliculata, brunnea.

— *Spec. Inf. II. p. 290. no. 6. T. Evonymella.*

Geoffr. Inf. p. 183. no. 4. Tinea alis superioribus, albis punctis nigris, inferioribus fuscis.

La *Teigne blanche à points noirs*.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lign.

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 487. Ph. T. Evonymella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Prodr. p. 133. no. 1542. Ph. T. Evonymella.*

351. *Padella, die Obstmotte.*

Müller l. c. p. 737. no. 351. die Obstmotte.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 818. T. Padella.

Füesl. Magazin der Entomol. 2 B. p. 39. Ph. T. *Padella*.

Frisch Inf. V. p. 38. no. 16. 2 Pl. t. 16. von den geselligen Blattmotten und ihren Papilions.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 17. t. 7. die graue gesellige Heckenfchabe, oder Schabenraupe, mit dem großen Gewebe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 33. Vogelkirschenschabenraupe (*Padi Pruni*); Vogelkirschenschabe. T. *Padella* L.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 789. no. 19. P. T. *Padella*, *Patscherbenmotte*.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 351. Tin. *Padella*.

Scop. Ent. carn. p. 247. no. 636. Ph. T. *Padella*.

Similis *Evonymellae*, sed diversa, 1) punctis paucioribus, nec ultra (20), 2) alis anticis minus albis, subtus ubique fuscis; 3) alis posticis utrinque fuscis totis.

Long. lin. $4\frac{1}{2}$.

Fabric. S. E. p. 656. no. 5. Tin. *Padella*. Nom. *Linn.*

Larva gregaria, nuda, grisea; segmentis utrinque puncto atro, sub tentorio communi.

Pupa folliculata, flavicans.

— *Spec.* Inf. II. p. 290. no. 7. Tin. *Padella*.

Schaeff. Icon. t. 145. f. 2. 3.

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 488. Tin. *Padella*. Nom. *Linn.*

— *Zool.* Dan. Pr. p. 133. no. 1543. Tin. *Padella*.

Degeer Inf. II. p. 479. no. 1. t. 10. f. 14. 15. 16.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes pendantes, d'un gris-de-perle cendré à vingt points noirs.

Phalène petit-deuil cendré à 20 points noirs.

Chenilles rases couleur d'ardoise, dont les deux extrémités du corps sont jaunes, avec deux rangs de taches noires & à seize pattes: fig. 10.

— Ueberf. II Th. I B. p. 354. no. 1. t. 10. f. 10. 14. 15. 16.

Die kleine aschfarbige Trauerphaläne mit zwanzig schwarzen Punkten.

352. *Sequella*, die Krummlinie.

Müller l. c. p. 737. no. 352. der Krummbalken.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 55. Steinsamenschabenraupe (*Lithospermi purpurei coerulei*); Steinsamenschabe. T. *Sequella* L.

Fabric. S. E. p. 657. no. 7. T. *Sequella*. N. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 291. no. 9. Tin. *Sequella*.

Clerk Phal. t. 10. f. 14.

353. *Crataegella*, Hagedornmotte. *)

Müller l. c. p. 737. no. 353. die Hagedornmotte.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 7. Hagedornschabenraupe (*Crataegi Oxyacanthae*); Hagedornschabe. T. *Crataegella* L.

354. *Irrorella*, der Dreypunkt.

Müller l. c. p. 737. no. 354. die Pomeranzenmotte.

Früesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 819. Tin. *Irrorella*.

Wien. Schmett. p. 68. C. Spindelraupen, Larvae *Fusiformes*; Schabenartige Eulen, Ph. Noct. *Tineiformes*: no. 6. Baumflechteneulenraupe (*Lichenis olivacei* etc.); Baumflechteneule. N. *Irrorea* (Tin. *Irrorella* L.).

Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 10. die Pomeranzenmotte.

F 2

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 657. no. 9. Tin. Irrorella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 291. no. 11. Tin. Irrorella.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1606. b. Tin. Irrorella. Nom. Linn.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 342. t. 5. f. 12.

Phalène à antennes barbues, à trompe; à ailes rabattues arrondies d'un jaune d'ocre clair, picquées de points noirs, dont le corps est noir & le bout du ventre jaune.

Phalène jaune à points noirs.

— *Uebers. II Th. I B. p. 248. t. 5. f. 12. die gelbe schwarzpunktierte Motte.*

355. *Lutarella, die Leimfarbige Motte.*

Müller l. c. p. 737. no. 355. die Gelblingin.

Wien. Schmett. p. 68. C. no. 3. Steinflechtenraupe (Lichenis saxatilis); Steinflechteneule. Noct. Luteola (Tin. Lutarella L.)

Clerk Phal. t. 4. f. 9.

Fabric. S. E. p. 657. no. 10. Tin. Lutarella.

Alis supra luteis, immaculatis, subtus fuscis.

— *Spec. Inf. II. p. 291. no. 13. Tin. Lutarella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 486. Tin. Lutarella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1559. Tin. Lutarella.*

356. *Mesomella, die Grasmotte.*

Müller l. c. p. 738. no. 356. Grasmotte.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 820. Ph. Mesomella.

Clerk Phal. t. 4. f. 14.

Fabric. S. E. p. 657. no. 11. Tin. Mesomella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 292. no. 14.*

Alis anticis pallidis, margine flavo, punctisque duobus fuscis.

357. *Oxyacanthella*, die *Weißdornmotte*. *)

Müller l. c. p. 738. no. 357. *Weißdornmotte*.

Fabric. S. E. p. 657. no. 12. Tin. *Oxyacanthella*.
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 292. no. 15. Tin. *Oxyacanthella*.

358. *Pinetella*, die *Fichtenmotte*.

Müller l. c. p. 738. no. 358. *Fichtenmotte*.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 7. *Föhrenschabenraupe* (*Pini sylvestris*); *Föhrenschabe*. Tin. *Pinetella* L.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 503. no. 8. Ph. Tin. *Pinetella*, die gelbe *Fichtenmotte*.

Knochs Beytr. I. p. 69. t. 4. f. 7. Ph. Tin. *Pinetella*, die *Fichtenmotte*.

Alis anticis pallide aurantiis; alba pyramide longitudinali fasciis binis colore alae interrupta.

Scop. Entom. carn. p. 244. no. 622. Ph. *Pinetella*.

Alae anticae ut in *Pascuella*; sed alba pyramide longitudinali, fasciis binis colore alae interrupta.

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 657. no. 13. Tin. *Pinetella*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 292. no. 16. Tin. *Pinetella*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1544. Tin. *Pinetella*. Nom. L.

359. *Pascuella*, die *Futterkrautmotte*. **)

Müller l. c. p. 738. no. 359. die *Futtermotte*.

F 3

Wien.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

Wien. Schmiett. p. 134. B. no. 4. *Unbek. R. Bleichgelbe Schabe mit einer geraden Silberstreife.*

Scop. Ent. carn. p. 244. no. 621. Ph. *Pascuella*.

Alae anticae pallide aurantiae; linea alba longitudinali, a basi fere ad limbum usque producta, utrinque acuminata, inferiore latere dente in medio instructa; linea limbi transversa, aliaque marginali argenteis; area his interjecta cinerea; apice introrsum plicata.

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 658. no. 15. Tin. *Pascuella*.

Alis cinereis, linea albissima, margine postico, nigro-punctato.

— *Spec. Inf. II.* p. 292. no. 18. Tin. *Pascuella*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1545. Tin. *Pascuella*. Nom. *Linn.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 465. no. 2.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes roulées d'un blanc jaunâtre avec des lignes longitudinales argentées, à barbillons allongés.

Phalène à ailes roulées blancheâtres, à lignes argentées.

— *Uebers. II Th. I B.* p. 342. no. 2. die *Phaläne* mit weislichen zusammengerollten Flügeln mit Silberfarbigen Linien.

360. *Pratella*, die *Wiesenmotte*.

Müller l. c. p. 738. no. 360. die *Wiesenmotte*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 24. no. 821. Ph. *Pratella*.

Wien. Schmiett. p. 135. B. no. 29. *Unbekannte Raupe; graue mit Silber geradgestrichte Schabe.*

Clerk Phal. t. 3. f. 14. (male).

Syst. Natur. du Regn. Anim. II. p. 163. no. 98.

Fabric. S. E. p. 658. no. 14. *Tinea Pratella*. Nom. *Linn.*

Fabric.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 292. no. 17. Tin. *Pratella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 491. Tin. *Pratella.*

Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1546. Tin. *Pratella.*

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 464. no. 1.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe, à ailes roulées d'un blanc argentés en dessus & d'un brun griseâtre en dessous.

Phaléne argentée à ailes roulées.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 341. no. 1. die *Silberphaläne mit zusammengerollten Flügeln.*

361. *Culmella*, die *Halmenmotte.*

Müller l. c. p. 739. no. 361. *Halmenmotte.*

Friesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 822. Phal. *Culmella.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 9. *Wurzelschabensraupe* (*Radicum graminis*); *Wurzelschabe.* T. *Culmella* L.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 97.

Schaeff. Icon. t. 145. f. 1. 2.

Raj. Hist. Inf. p. 229. no. 106.

Phalaena minor pascuorum gemina proboscide, alis oblongis, cum sedet, circumvolutis, exterioribus ex argenteo lutescentibus vel argenteis vel plumbeis.

Aët. Upsal. 1736. p. 26. no. 82. Papilio alis depressis cuneiformibus oblongis striatis.

Scop. Entom. carn. p. 246. no. 630. Phal. *Culmella.*

Albida tota et immaculata; alis posticis fimbria argentea; oculis nigris.

Long. lin. $4\frac{1}{3}$.

Fabric. S. E. p. 658. no. 16. T. *Culmella.*

Alis cinereis; linea unica albissima, abbreviata.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 233. no. 19. Tin. Culmella.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1549. Tin. Culmella. Nom. Linn.

362. *Rorella*, die *Thaumotte*. *)

Müller l. c. p. 739. no. 362. Thaumotte.

363. *Carnella*, der *Blutrand*.

Müller l. c. p. 739. no. 363. Fleischrolle.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 823. Tin. Carnella.

— *Magaz. der Entomol. II B. p. 107.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 13. Unbekannte Raupe; rosenrothe und gelbe Schabe.

Naturforsch. III St p. 7. t. 1. f. 6. die Rosenrothe Binde, Fascia Rosea, (D. Kühn.)

Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 12. die Fleischrolle.

Schaeff. Icon. t. 247. f. 2. 3.

Fabric. S. E. p. 658. no. 18. Tin. Carnella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 293. no. 21. Tin. Carnella.*

364. *Nemorella*, die *Waldmotte*. **)

Müller l. c. p. 739. no. 264. Waldmotte.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 939. no. 3. die weißliche Waldmotte mit gekrümmten Flügeln, wovon die obern am innern Rande einen schwarzen Punkt haben.

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 492. Tin. Nemorella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1547. Tin. Nemorella.*

365. Un-

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

365. *Unguicella*, der Nagelflügel.*Müller* l. c. p. 739. no. 365. *Nagelflügel*.*Clerk* Phal. t. 12. f. 7.*Syst. Nat. du Regn. Anim.* II. p. 159. no. 80.*Fabric.* S. E. p. 654. no. 51. *Pyralis unguicana*.Nom. *Linn.*— *Spec. Inf.* II. p. 287. no. 70. *Pyralis unguicana*.366. *Ramella*, die Eichenmotte. *)*Müller* l. c. p. 740. no. 366. *Eichenmotte*.*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 657. no. 46. *Tinea Ramella*, die kleine weißgraue Sprossenschabe.367. *Salicella*, die Weidenmotte.*Müller* l. c. p. 740. no. 367. t. 22. f. 16. *Weidenmotte*.*Füesl.* Schweiz. Inf. p. 42. no. 824. Tin. *Salicella*.*Röfels* Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 20. t. 9. der auf Weidenbäumen wohnende schwarze und mit weißen Punkten besetzte Blattwickler.*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 39. no. 102. p. 62. no. 172. Tin. *Salicella*, *Weidenmotte*.*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 785. no. 83. Tin. *Salicella*, die kleine blaugraue weißpunktirte Weidenmotte.*Wien.* Schmett. p. 131. E. no. 37. *Bandweidenwickler* (raupe (*Salicis viminalis*); *Bandweidenwickler*. Tortr. *Salicana*.*Sulzers* Kennz. t. 16. f. 97.*Fabric.* S. E. p. 659. no. 21. Tin. *Salicella*. Nom. *Linn.**Larva* nuda, 16-poda, fusca, albo-punctata.*Pupa* antice nigra, postice brunnea.

F 5

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 294. no. 27. Tin. Salicella.

368. *Cynosbatella*, die *Rosenmotte*.

Müller l. c. p. 740. no. 368. Rosenmotte.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 825. Tin. Cynosbatella.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 1033. no. 5. Tin. Cynosbatella, die graue Knospenmotte der Heckrosen mit weißen Flügelspitzen und einem schwarzen Punkt.

Fabric. S. E. p. 654. no. 54. Pyralis Cynobana. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 287. no. 74. Pyr. Cynobana.*

Mülleri Faun. Fr. p. 56. no. 494. Tin. Cynosbatella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1548. Tin. Cynosbatella.*

Degeer Inf. I. t. 34. f. 4. 5.

— *Uebersf. I. 3 Quart. p. 76.*

— *Tom. II. Part. I. p. 486. no. 5.*

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes pendantes d'un brun noirâtre par devant & blanches par derrière avec des taches brunes, à corcelet non-huppé.

Phalène brune par devant & blanche par derrière à taches brunes.

— *Uebersf. II Th. I B. p. 359. no. 5. die braungefleckte, vorn braune und hinten weiße Phaläne.*

369. *Foenella*, die *Heumotte*.

Müller l. c. p. 740. no. 369. Heumotte.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 826. Tin. Foenella.

Clerk Phal. t. 2. f. 13.

Fabric.

Fabric. S. E. p. 659. no. 22. Tin. Foenella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 294. no. 29. Tin. Foenella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 517. Tin. Foenella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1550. Tin. Foenella.*

370. *Vestianella*, die *Tuchmotte*. *)

Müller l. c. p. 740. no. 370. Tuchmotte.

Fischers Naturgesch. von Livland p. 154. no. 373. Tuchmotte.

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 669. Ph. Vestianella.

Alae cinerascens; costa alba.

Long. lin. 3½.

Fabric. S. E. p. 660. no. 25. Tin. Vestianella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 295. no. 32. Tin. Vestianella.*

371. *Tapetzella*, die *Tapetenmotte*.

Müller l. c. p. 741. no. 371. Tapetenmotte.

Fischers N. G. von Livland p. 155. no. 374. Tapetenmotte.

Wien. Schmiett. p. 142. D. no. 13. Tapetenschabenraupe (Tapetium etc.); Tapetenschabe. T. Tapetzella L.

Raj. Hist. Inf. p. 204. no. 98. Tinea vestivora major, alis oblongis acutis; exterioribus ad scapulas nigricantibus, inferius albentibus, interioribus fuscis sive cinereis.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 82.

Clerk Phal. t. II. f. 12.

Geoffr. Inf. II. p. 187. no. 13.

Tinea nigra, capite niveo, alis pone albidis.

La Teigne bedaupe à tête blanche.

Long.

*) Nicht abgebildet.

Long. 4½ lign.

Fabric. S. E. p. 659. no. 23. Tin. *Tapetzella*.

Alis nigris, postice albis, capite niveo.

— *Spec. Inf.* II. p. 295. no. 30. Tin. *Tapetzella*. *)

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 503. Tin. *Tapetzella*. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 134. no. 1552. Tin. *Tapetzella*.

372. *Pellionella*, die *Pelzmotte*. **)

Müller l. c. p. 741. no. 372. *Pelzmotte*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 827. Tin. *Pellionella*.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 46. t. 17. die dem Pelzwerk sehr schädliche Schabenraupe.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 119. no. 336. Tin. *Pellionella*.

Neuer Schaupl. der Nat. I B. p. 144. VI. p. 406. *Pelzmotte*.

Olaßens Reise durch Island I. p. 320. *Pelzmotte*.

Allgem. Magaz. der Nat. X. p. 365. *Pelzmotte*.

Fischers N. G. von Livland p. 155. no. 375. die *Pelzmotte*.

Eberts Naturl. für die Jug. III. p. 95.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 24. *Pelzmotte*.

Der *Dronth.* Gesellsch. Schr. IV. p. 286. no. 48. Tin. *Pellionella*.

Onomat.

*) Die vom Fabricius hierbey angeführte zwote Untergattung des Geoffroy no. 14. la Teigne bedaupe à tête brune, ist *Linn. Ph. Tortr. Fasciana* no. 283. (*Wien. Schmett.* p. 131. no. 36.)

**) Conf. Scop. Tin. *Zoolegella*: Ent. carn. no. 666. forte eadem, sed *Tinea* haec Scop. non est cana. v. unter den neuen no. 196.

Onomat. hist. nat. VI. p. 395. Pelzschabe.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 84. Teigne, qui ronge les habits à poils.

Geoffr. Inf. II. p. 184. no. 6.

Tinea plumbea nitida, puncto nigro in medio alarum.

La Teigne commune.

Long. 2 lign.

Fabric. S. E. p. 659. no. 24. Tin. Pellionella. Nom. Linn.

Larva albicans, linea dorsali rubra, intra cucullum latitans.

Pupa flavescens.

— *Spec. Inf. II. p. 295. no. 31. Tin. Pellionella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 504. Tin. Pellionella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1553. Tin. Pellionella.*

373. *Sarcitella*, die Kleidermotte.

Müller l. c. p. 741. no. 373. Kleidermotte.

Früesl. schweiz. Inf. p. 42. no. 828. Tin. Sarcitella. In den Kleiderschränken.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 41. t. 15. die den Insektensammlungen höchst schädliche Schabenraupe.

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 143. Tuchaftermoten.

*Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 119. no. 336. Tin. Sarcitella. *)*

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 41. Kleiderschabenraupe

*) Hier wird die auf t. 17. im Röfel abgebildete Motte für Pellionella und Sarcitella angegeben, da doch t. 15. eigentlich die Sarcitella ist.

pe (Vestimentorum); *Kleiderschabe*. Tin. *Sarcitella* L.

Fischers N. G. von Livland p. 155. no. 376. *Kleidermotte*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 25. *Kleidermotte*.

Berlin. Samml. VII. p. 613. Mittel gegen die *Kleidermotten*.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 83.

Fabric. S. E. p. 660. no. 26. Tin. *Sarcitella*. Nom. *Linn.*

Parva; tota cinerea, nitida.

— *Spec. Inf.* II. p. 295. no. 33. Tin. *Sarcitella*.

374. *Nisella*, der *Eyerfleck*.

Müller l. c. p. 741. no. 374. *Eyerfleck*.

Scop. Ent. carn. p. 247. no. 634. Tin. *Nisella*.

Alae anticae canescentes; macula communi ovata nigricante.

In *Sylvis*.

Long. lin. $4\frac{3}{4}$.

Clerk Phal. t. 12. f. 6.

375. *Mellonella*, der *Honiglecker*.*)

Müller l. c. p. 741. no. 375. *Honiglecker*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 829. Tin. *Mellonella*. In den *Bienenkörben* und im *Wachstuch*.

Röfels Insektenbel. III. p. 242. t. 41. die zu der NV. 4ter Kl. gehörige *Bienenschabe*.

Swammerd. Bib. der Nat. Fol. p. 208. t. 26. f. 2. der *Wolf* in den *Bienenkörben*.

Neuer

*) Diese Art Motten nennet *Columella* Lib. 3. cap. 14. Vermiculos ac Tineas. *Virgil.* Georg. 4. Dirum Tineae genus. *Plin.* H. N. Lib. XI. c. 19. Papilionem ignavum.

Destruuntur fumo funi mixti cum medula bovina.

Neuer Schaupl. der Nat. I B. p. 142. *Aftermotte*; *Bienenmotte*; *Bienenschabe*; *Bienenfalter*; *Faufse-teigne de la cire*; *Wolf*.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 2. *Honigschabenraupe* (*Mellis in Alvearibus*); *Honigschabe*. T. *Mellonella* L.

Bonnets Betr. über die Natur p. 457 *Aftermotten*.

Eberts Naturl. für die Jug. III. p. 95.

Abhandl. der schwed. Ges. der Wiss. 24 B. p. 24. *Unterf. und Beschr. einer der Bienenzucht höchst schädlichen Raupe und des daraus entstehenden Schmetterlings*, von Adolph *Modeer*. t. I. f. 1. 12. Tin. *Mellonella* L.

Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 372. no. 19. Tin. *Mellonella*.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 375. Tin. *Mellonella*.

Scop. Ann. 4. hist. nat. p. 40. obs. 15. *Tinea Mellonella*.

Fabric. S. E. p. 660. no. 28. Tin. *Mellonella*. Nom. *Linn.*

Larva nuda, 16-poda, grisea, capite brunneo.

Pupa folliculata, brunnea.

— *Spec. Inf.* II. p. 296. no. 36. Tin. *Mellonella*.

376. *Cucullatella*, die *Sperbermotte*.

Müller l. c. p. 742. no. 376. *Sperbermotte*.

Friesl. schweiz. Inf. p. 42. no. 830. Tin. *Cucullatella*. Auf *Birn- und Apfelblättern*.

— *Magaz. der Entomol.* II. p. 39. Tin. *Cucullatella*.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 24. t. II. das kleine, braune, haarige Apfelbaumräuplein mit weissen Schildern.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 848. no. 3. *Tinea Cucullatella*, die *weisse Vogelbeerbaummotte*.

Onomat. Hist. nat. VI. p. 346. die *Sperbermotte*.

Fabric. S. E. p. 660. no. 29. *Tin. Cucullatella*.

Alis argenteis; arcu dorsali fusco.

Larva pilosa, 14-poda, fusca; dorso albo maculato.

Pupa folliculata, obtusa, fusca.

— *Spec. Inf. II.* p. 296. no. 37. *Tin. Cucullatella*

377. *Granella*, die *Kornmotte*. *)

Müller l. c. p. 742. no. 377. *Kornwurm*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 831. *Tin. Granella*.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 25. t. 12. der schädliche, wohlbekannte, *weisse Kornwurm*.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 78. no. 223. p. 89. no. 257. *Tin. Granella*, der *Kornwurm*.

Bakers zum Gebrauch leicht gemachtes Microscopium p. 236. t. XI. f. 13. A B. *Wolf im Korn*.

Bonnets Betr. über die Natur p. 458. *Aftermotten auf den Kornböden*.

Berlin. Samml. IV. p. 341. *Kornwurm* no. 1.

Martini Naturlex. I. 634. *Getreideaftermotten; der Wolf; der weisse Kornwurm. Tin. Granella*.

Abhandl. der königl. schwed. Gef. der Wiss. VIII. p. 49. t. 1. f. 1-4. *Raupe*. Beschr. kleiner *weisser Raupen*, welche das Korn auf Böden und Vorrathsbehältnissen verzehren. (Carl Degeer.)

Oekonomische Nachr. der patriotischen Gef. in Schlesien I. p. 159. *Kornmotte*.

— II. p. 119. *Kornmotte*.

Neuer

*) Ich nenne sie lieber *Kornmotte*, um sie von dem *Kornwurm*, *Curculio granarius et frumentarius*, zu unterscheiden.

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 144. Kornmotten.

Eberts Naturl. für die Jugend III. p. 95.

Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 372. no. 20. Tin.

Granella, Wolf; weißer Kornwurm.

*Wien. Schmett. p. 144. C. no. 77. Kornschabenrau-
pe (Frumenti in Granariis); Kornschabe. Tin.
Granella L.*

*Loevenhoek Opp. Tom. II. Arcana Nat. detecta p.
241-252. f. 2. A A. Lupus.*

Tiburtius von den Kornmotten. Berlin. 12. 1665.

*Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 377. Tin. Granella,
weißes Kornwurm; Wolf.*

*Bomar. Dict. des Anim. IV. 313. VIII. 245. Fausse-
Teigne du Bled.*

*Fabric. S. E. p. 668. no. 8. Alucita granella. Nom.
Linn.*

Larva 16-poda, nuda, alba, capite brunneo.

Pupa folliculata, attenuata, brunnea.

— *Spec. Inf. II. p. 307. no. 10. Alucita gra-
nella.*

Geoffr. Inf. II. p. 186. no. 11.

Tinea tota fusco-nebulosa, capite albido.

La Teigne brune à tête blancheâtre.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lign.

*Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1556. Tin. grä-
nella. Nom. Linn.*

378. *Lappella*, die Klettenmotte.

Müller l. c. p. 742. no. 378. Klettenmotte.

*Abhandl. der königl. schwed. Ges. der Wiss. XIV.
p. 72. der Klettenschmetterling (von Renström).*

*Phalaena feticornis, spirilinguis, alis incum-
bentibus; superioribus cinereo-griseis, puncto
atro; inferioribus atris, omnibus margine postico
interiore, barbatis.*

*Wien. Schmett. p. 142. D. no. 12. Klettenschaben-
raupe (Arctii Lappae); Klettenschabe. Tin. Lapp-
pella L.*

Clerk Phal. t. II. f. 15.

*Fabric. S. E. p. 668. no. 9. Alucita Lappella
Nom. Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 308. no. 12. Aluc. Lappella.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 510. Tin. Lappella.
Nom. Linn.*

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1555. Tin. Lappella.*

379. *Proletella, die Muttermotte. *)*

Müller l. c. p. 742. no. 379. Muttermotte.

*Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 832. Tin. Proletella.
Auf der Unterseite des Kohls.*

*Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 17. Mutter-
motte.*

380. *Arbutella, Bärentraubenmotte. **)*

Müller l. c. p. 742. no. 380. Bärentraubenmotte.

Cathol. A. p. 446. Arbutella, Sandbeerenmotte.

Fabric. S. E. p. 661. no. 30. Tin. Arbutella.

*Alis rufis, strigis argenteis, intermediis bifi-
dis.*

— *Spec. Inf. II. p. 296. no. 39. Tin. Arbutella.*

*Mülleri Faun. Fr. p. 56. no. 496. Tin. Arbutella.
Nom. Linn.*

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1557. Tin. Arbu-
tella.*

381. *Tessella, die Würfelmotte. ***)*

Müller l. c. p. 742. no. 381. Würfelmotte.

Füesl.

*) Parit quotannis 200000 soboles, dum 12 progenies ponant 12 ova singula.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 833. Tin. *Tessella*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 978. no. 25. Tin. *Tessella*.

Die schwarzgeflügelte Motte mit zwey weissen weit aus einander stehenden gewürfelten Binden.

Franz von Paula Schrank Beytr. zur Naturgesch. p. 81. *Würfelmotte*. Tin. *Tessella*.

Der Dronth. Gesellsch. Schr. IV. p. 287. no. 49. Tin. *Tessella*.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 87.

Fabric. S. E. p. 661. no. 31. Tin. *Tessella*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 296. no. 40. T. *Tessella*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1560. Tin. *Tessella*.

382. *Vittella*, die Schwarzbinde.

Müller l. c. p. 743. no. 382. *Schwarzlinie*.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 42. *Ubekannte Raupe*; *Aschgraue Schabe mit schwarzem Innenrande*. T. *Vittella* L.

Clerk Phal. t. 15. f. 10.

Fabric. S. E. p. 668. no. 6. *Alucita Vittella*.

Alis cinereis; vitta dorsali margineque postico nigris.

— Spec. Inf. II. p. 307. no. 7. Aluc. *vittella*.

In *Lipsiae* hortis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 489. Tin. *vittella*. Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1554. Tin. *vittella*.

383. *Ustella*, der Brandrand.

Müller l. c. p. 743. no. 383. *Brandrand*.

Clerk Phal. t. 3. f. 13.

384. *Parenthesella*, die *Weisslinie*. *)

Müller l. c. p. 743. no. 384. *Weisslinie*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 834. Tin. *Parenthesella*. Auf den *Viehweiden*.

Fabric. S. E. p. 661. no. 33. Tin. *Parenthesella*.
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 297. no. 43. Tin. *Parenthesella*.

385. *Elongella*, der *Schmalflügel*. **)

Müller l. c. p. 743. no. 385. *Schmalflügel*.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 67. *Unbek. Raupe*;
Beinfarbige Schabe. Tin. *Elongella* L.

Fabric. Mantiss. p. 295. no. 33-34. Tin. *Elongella*.
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 297. no. 44. Tin. *Elongella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 514. Tin. *Elongella*.
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 135. no. 1564. Tin. *Elongella*.

386. *Punctella*, der *Punktflügel*. ***)

Müller l. c. p. 743. no. 386. *Punktflügel*.

Fabric. S. E. p. 661. no. 34. Tin. *Punctella*. Nom.
Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 297. no. 46. Tin. *Punctella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 515. Tin. *Punctella*.
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 135. no. 1565. Tin. *Punctella*.

387. *Bicostella*, die *Doppelrippe*.

Müller l. c. p. 743. no. 387. *Doppelrippe*.

Clerk Phal. t. 3. f. 15.

Scop.

*) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

Scop. Entom. carn. p. 249. no. 642. Phal. bico-
stella.

Caput, dorsum, alae anticae, alba; linea longitudinali ferruginea a basi ad apicem excurren-
te prope marginem crassiore; disco punctis
subternis atris.

Circa *Idriam.*

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 661. no. 32. Tin. bico-
stella.

Alis cinereis, linea longitudinali fusca, pal-
pis porrectis.

— *Spec. Inf. II. p. 297. no. 42. Tin. bico-*
stella.

In *Europae* hortis.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1562. Tin. bico-
stella. Nom. Linn.

388. *Tetrapodella, Vierfuss. *)*

Müller l. c. p. 744. no. 388. Vierfuss. Auf den
Kirschbäumen.

389. *Xylostella, die Leukogenmotte.*

Müller l. c. p. 744. no. 389. Leukogenmotte.

Friesl. schweiz. Inf. p. 42. no. 835. Tin. Xylostella.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 22. t. 10. das
sehr kleine Kohl- und Salaträuplein.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 103. no. 294. die
Leukojenmotte.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 54. Heckkirschenscha-
benraupe (Loniceri Xylostei); Heckkirschenscha-
be. Tin. Xylostella L.

Der Dronth. Gesellsch. Schr. IV. p. 287. no. 50. Tin.
Xylostella.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 939. no. 2. Phal. Tinea
Xylostella.

*) Nicht abgebildet.

Die aschgraue *Welpermeymotte* mit einem weissen zackichten Flecke.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 99.

Fabric. S. E. p. 667. no. 1. Alucita Xylostella.
Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 306. no. 1. Aluc. Xylostella.*

Geoffr. Inf. II. p. 195. no. 35.

Tinea cinerea, dorso vitta longitudinali alba.

La Teigne à bandelette blanche.

Long. 3 lign.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1562. Tin. Xylostella. Nom. Linn.

390. *Cinctella*, die *Pappelmotte*. *)

Müller l. c. p. 744. no. 390. Pappelmotte.

Friesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 836. Tin. Cinctella.

Der Dronth. Gesellsch. Schr. IV. p. 288. no. 53. Tin. Cinctella.

Scop. Ent. carn. p. 252. no. 651. Phal. Vorticella.

Nigra, alis anticis fascia alba lineari.

In foliis fruticum.

Long. lin. 2 $\frac{3}{4}$.

Fabric. S. E. p. 662. no. 36. Tin. cinctella.

Alis nigris, anticis striga argentea.

— *Spec. Inf. II. p. 298. no. 48. Tin. cinctella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 495. Tin. cinctella.
Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1558. Tin. cinctella.*

391. *Leucatella*, das *Weissband*. **)

Müller l. c. p. 744. no. 391. Weissband.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 42. Unbekannte Raupe; schwärzlichte Schabe mit weissem Bande und Punkten.

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 662. no. 37. Tin. Leucatella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 298. no. 49. Tin. Leucatella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 516. Tin. Leucatella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1566. Tin. Leucatella.*

392. *Cinerella, der Grauflügel. *)*

Müller l. c. p. 744. no. 392. Grauflügel.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 25. Unbek. R. Grauglänzende Schabe.

Fabric. S. E. p. 662. no. 40. Tin. Cinerella.

Alis fusco-cinereis, nitidulis, immaculatis.

— *Spec. Inf. II. p. 299. no. 55. Tin. Cinerella.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1563. Tin. Cinerella. Nom. Linn.

393. *Trigonella, das Doppeldreyeck. **)*

Müller l. c. p. 745. no. 393. Doppeldreyeck.

Der Dronth. Gesellsch. Schr. IV. p. 287. no. 81. Tin. Trigonella.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 978. no. 26. Tin. Trigonella, die braune Motte mit dem gedoppelten weissen dreyeckigen Fleck.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 163. no. 101.

Fabric. S. E. p. 663. no. 42. Tin. Trigonella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 299. no. 57. Tin. Trigonella.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1567. Tin. Trigonella. Nom. Linn.

394. *Rhomboïdella, das schwarze Viereck. ***)*

Müller l. c. p. 745. no. 394. Schwarzviereck.

G 4

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 663. no. 43. Tin. Rhomboïdella.
 Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 299. no. 58. Tin. Rhomboïdella.*

395. *Tertianella*, die *Dunkelstreife*. *)

Müller l. c. p. 745. no. 395. Dunkelstrich.

— *Faun. Fridr. p. 57. no. 511. Tin. Tertianella.*
 Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1568. Tin. Tertianella.*

396. *Scabrella*, der *Schuppenflügel*. **)

Müller l. c. p. 745. no. 396. Schuppenflügel.

Fabric. Mantiss. p. 297. no. 10-11. Alucita Scabrella.

Alis fusco-cinereis, punctis nigris elevatis scabris.

— *Spec. Inf. II. p. 308. no. 14. Aluc. Scabrella.*

397. *Asperella*, der *Schuppenfleck*. ***)

Müller l. c. p. 745. no. 397. Schuppenfleck.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 837. Tin. Asperella.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 46. Unbekannte Raupe; grünweißlichte Schabe mit gesichelten Oberflügeln.

Catholicon A. p. 535. Asperella, die rauhe Motte.

398. *Serratella*, der *Langschenkel*. †)

Müller l. c. p. 745. no. 398. Langschenkel.

399. *Populella*, der *Haarflügel*. ††)

Müller

*) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

Müller l. c. p. 746. no. 399. *Haarflügel*.

400. *Mercurella*, die *Quecksilbermotte*. *)

Müller l. c. p. 746. no. 400. *Quecksilbermotte*.

401. *Pomonella*, die *Obstmotte*.

Müller l. c. p. 746. no. 401. *Birnmotte*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 835. Tin. *Pomonella*.

Frisch Inf. VII. p. 16. no. 10. 2te Pl. t. 10. der *Obst-
wurm in Birnen und Aepfeln*.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 33. t. 13. die
kleine Apfel- und Birnraupe, oder der sogenann-
te *Apfel- und Birnenwurm*.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 39. no. 104. p. 62.
no. 173. Tin. *Pomonella*, *Birnmotte*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 789. no. 18. Tin. *Pomo-
nella*, die *Birnraupe*.

Wien. Schmett. p. 126. B. no. 10. *Apfelwicklerrau-
pe* (*Pyri mali*); *Apfelwickler*. T. *Pomonana* (*Po-
monella* L.).

Onomat. hist. nat. VI. p. 399. die *Birnmotte*.

Behm. Ep. S. L. p. 168. no. 401. Tin. *Pomonella*.

Fabric. S. E. p. 653. no. 49. *Pyrallis Pomana*.
Nom. Linn.

Larva 16-poda, nuda, rufa, capite nigro.

Pupa folliculata, brunnea.

— Spec. Inf. II. p. 286. no. 67. *Pyrallis Pomana*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 505. Tin. *Pomonel-
la*. Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1576. Tin. *Pomo-
nella*.

402. *Strobilella*, die *Tannzapfenmotte*.

Müller l. c. p. 746. no. 402. *Zapfenmotte*.

*) Nicht abgebildet.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 839. Tin. *Strobilella*.
Gleditsch Forstwiss. I. p. 504. no. 9. Tin. *Strobilel-*
la, *Tannzapfenmotte*.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 24. *Tannzapfenscha-*
benraupe (*Strobilorum abietis*); *Tannzapfen-*
schabe. Tin. *Strobilella* L.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 164. no. 104.

Clerk Phal. t. 12. f. 10.

Fabric. S. E. p. 662. no. 38. Tin. *Strobilella*. Nom.
Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 298. no. 50. Tin. *Strobilella*.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 490. no. 9. t. 9. f. 15.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à
ailes pendantes d'un brun obscur avec des rayes
transverses couleur d'agate.

Petite Phalène des Pommes de Sapin.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 362. no. 9. t. 9. f. 15. die
kleine Tannapfelphaläne.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 506. Tin. *Strobilel-*
la. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 136. no. 1577. Tin. *Strobi-*
lella.

403. *Turionella*, die *Anflugmotte*.

Müller l. c. p. 746. no. 403. *Anflugmotte*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 504. no. 10. Tin. *Turio-*
nella, die *Lichtgraue Maywachsmotte*.

Degeer Uebers. I Th. 3 Quart. p. 74.

Clerk Phal. t. 12. f. 15.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 507. Tin. *Turionel-*
la. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 156. no. 1578. Tin. *Turio-*
nella.

404. *Dodecella*, der *Zwölfpunkt*.

Müller

Müller l. c. p. 747. no. 404. *Zwölfpunkt.*

Gleditsch Forstwiss. I. p. 504. no. II. Tin. *Dodecella*, die *Lichtgraue und braunstipplichte Maywachsmotte.*

Degeer Inf. I. t. 22. f. 22. 23. 24.

— Uebers. 3 Quart. p. 73.

— Inf. Tom. II. Part. I. p. 494. no. 3.

Phalène à antennes filiformes, à trompe; à ailes étroites un peu élevées grises à quatre bandes onnées noirâtres & six huppées élevées noires.

Phalène teigne à douze huppées sur les ailes.

— Uebers. II Th. I B. p. 365. no. 3. die *Mottenphaläne mit zwölf Bürstgen auf den Flügeln.*

Fabric. Spec. Inf. II. p. 298. no. 53. Tin. *Dodecella*, grisea, nigro-punctata.

Larva 16-poda, laevis ferruginea.

Pupa folliculata, conica, ferruginea.

Imago palpis reflexis coniformibus.

Ledermüller Gemüths- und Augenergötzung p. 122. t. 64. der Saame von der rothen Tanne oder Fichte, und die denselben so schädliche kleine Raupe mit ihrer Verwandlung zur Schabe. *)

405. *Cembrella*, der *Weisssprenkel.* **)

Müller l. c. p. 747. no. 405. *Weisssprenkel.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 39. *Fichtenschabenraupe* (*Pini Sylvestris*); *Fichtenschabe.* Tin. *Cembrella* L.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 508. Tin. *Cembrella.* Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 156. no. 1579. Tin. *Cembrella.*

406. *Re-*

*) Da die kleine Motte hier t. 64. 1. punktirt abgebildet ist; so glaube ich, dass es die *Dodecella* ist.

**) Nicht abgebildet.

406. *Resinella*, die Harzmotte.

Müller l. c. p. 747. no. 406. Harzmotte.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 840. Tin. *Resinella*,
Frisch Inf. X. p. 11. no. 9. 2te Pl. t. 9. die Kien-
sprossenmotte.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 44. t. 16. die in
den Harzbeulen des Kiehn- oder Föhrenbaums
wohnende *Sehabenraupe*.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 117. no. 331. Tin.
Resinella, Harzmotte.

Bonnets und anderer Abhandl. aus der Insektol. p.
391.

Fr. von Paula Schrank Beytr. zur N. G. p. 42. Kien-
sprossenmotte. Fliege aus derselben. t. 2. f. 5.

Fischers N. G. von Livl. p. 155. no. 377. Kienprof-
senmotte.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 406. Tin. *Resinella*.

Fabric. S. E. p. 654. no. 55. *Pyrallis Resinana*,
Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 288. no. 75. Tin. *Resinana*.

Larva 16-poda, nuda, lutea, capite brunneo.

Pupa folliculata, fusca.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 508. *Tinea Resinel-*
la. Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1580. Tin. *Resinella*.

Degeer Inf. I. t. 33. f. 12. 13.

— Ueberf. I. 3 Quart. p. 65.

— Tom. II. P. I. p. 491. no. 10.

Phalène à antennes filiformes, à trompe; à
ailes pendantes d'un gris cendré avec des rayes
transverses & des nuances noires.

Phalène des galls résineuses du Pin.

— Ueberf. II Th. I B. p. 363. no. 10. die Fichten-
harzphaläne.

407. *Taedella*, der Spaltfleck.

Müller l. c. p. 747. no. 407. *Spaltfleck*.

Clerk Phal. t. 10. f. 13.

408. *Iuniperella*, die Wacholdermotte. *)

Müller l. c. p. 747. no. 408. *Wacholdermotte*.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 26. *Wacholderschabenraupe* (*Iuniperi communis*); *Wacholderschabe*. Tin. *Iuniperella* L.

Cathol. I. p. 405. *Iuniperella*.

409. *Fuscella*, die Hausmotte. **)

Müller l. c. p. 748. no. 409. *Hausmotte*.

Fabric. S. E. p. 662. no. 39. Tin. *Fuscella*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 299. no. 54. Tin. *Fuscella*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1569. Tin. *Fuscella*. Nom. Linn.

410. *Minutella*, die Miniaturmotte. ***)

Müller l. c. p. 748. no. 410. *Mignaturmotte*.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 30. Unbek. R. *Kupferbraune Schabe mit unterbrochenem gelben Querbande*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 300. no. 63. *Alis atris, maculis duabus ferrugineis suboppositis*.

In Europae hortis.

411. *Corticella*, die Rindenmotte. †)

Müller l. c. p. 748. no. 411. *Rindenmotte*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 558. no. 14. Tin. *Corticella*, die Rindenmotte.

412. *Sti-*

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

412. *Stipella*, der Schwefelfleck.

Müller l. c. p. 748. no. 412. Schwefelfleck.

Pontopp. N. G. von Dännem. p. 222. Tin. *Stipella*.
t. 17.

Clerk Phal. t. 12. f. 5.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1575. Tin. *Stipella*.
la. Nom. Linn.

413. *Sylvella*, die Rostbinde. *)

Müller l. c. p. 748. no. 413. das Bartköpfchen.

Fabric. S. E. p. 667. no. 3. *Alucita Sylvella*.
Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 306. no. 4. *Aluc. Sylvella*.

414. *Gemmella*, der Eichenblattminirer.

Müller l. c. p. 748. no. 414. Silberwolke.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 657. no. 47. Tin. *Gemmella*,
die kleine Eichenblattschabe.

Clerk Phal. t. 10. f. 10.

Fabric. S. E. p. 663. no. 44. Tin. *Gemmella*. Nom.
Linn.

— Spec. Inf. II. p. 299. no. 59. Tin. *Gemmella*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1570. Tin. *Gemmella*.
mella. Nom. Linn.

415. *Bractella*, der Goldflügel.

Müller l. c. p. 749. no. 415. Goldflügel.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 841. Tin. *Bractella*.

Clerk Phal. t. 12. f. 4.

Fabric. S. E. p. 662. no. 41. *Tinea Bractella*.

Alis nigris, macula baseos fasciaque media in-
terrupta sulphureis.

— Spec. Inf. II. p. 299. no. 56. Tin. *Bractella*.

Mülleri

*) Nicht abgebildet.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1571. Tin. *Brastella*. Nom. Linn.

416. *Aristella*, die Silberlinie. *)

Müller l. c. p. 749. no. 416. Silberlinie.

Cathol. A. p. 477. *Aristella*.

Fabric. S. E. p. 669. no. 11. *Alucita Aristella*.
Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II.* p. 308. no. 15. Aluc. *Aristella*.

417. *Caudella*, die Schwanzlinie. **)

Müller l. c. p. 749. no. 417. Schwanzlinie.

Fabric. S. E. p. 669. no. 12. *Alucita Caudella*.

Alis subcaudatis, testaceis; linea postica fusca.

— *Spec. Inf. II.* p. 308. no. 16. Aluc. *Caudella*.

418. *Capitella*, der Gelbkopf. ***)

Müller l. c. p. 749. no. 418. Gelbkopf.

Fabric. S. E. p. 663. no. 45. Tin. *Capitella*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II.* p. 300. no. 60. Tin. *Capitella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 493. Tin. *Capitella*.
Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 136. no. 1581. Tin. *Capitella*.

419. *Porrectella*, der Hahnenschwanz.

Müller l. c. p. 749. no. 419. t. 22. f. 17. das Langhorn.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 62. Unbek. R. Weißgestrichte Schabe mit gelblichem Unterrande.
Tin. *Porrectella* L.

Degeer

*) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

****) Nicht abgebildet.

Degeer Inf. I. t. 26. f. 15. 16.

— *Uebersf.* I. 3 Quart. p. 12.

— *Tom.* II. P. I. p. 494. no. 2.

Phalène à antennes filiformes, à trompe; à ailes étroites élevées d'un gris blancheâtre à bande longitudinale onquée brune.

Phalène teigne blancheâtre de la Juliane.

— *Uebersf.* II Th. I B. p. 364. no. 2. die weißliche Mottenphaläne der *Viola matronalis*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1572. Tin. *Porre. Stella.* Nom. *Linn.*

420. *Pedella*, die braune Dreybinde. *)

Müller l. c. p. 750. no. 420. das Querbein.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 513. Tin. *Pedella.* Nom. *Linn.*

— *Zool.* Dan. Pr. p. 136. no. 1582. Tin. *Pedella.*

421. *Argentella*, die Silbermotte.

Müller l. c. p. 750. no. 421. Silbermotte.

Fabric. S. E. p. 658. no. 17. Tin. *Argentella.* Nom. *Linn.*

— *Spec.* Inf. II. p. 293. no. 20. Tin. *Argentella.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 483. no. 2. t. 10. f. 19.

Phalène à antennes filiformes, à trompe; à ailes pendantes d'un blanc argenté, dont le dessous des supérieures est ardoisé, & dont l'extrémité du ventre est jaune.

Phalène argentée.

— *Uebersf.* II Th. I B. p. 357. no. 2. t. 10. f. 19. die Silbermotte.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1573. Tin. *Argentella.* Nom. *Linn.*

422. *Cal-*

*) Nicht abgebildet.

422. *Calthella*, die *Sumpfdottermotte*. *)

Müller l. c. p. 750. no. 422. *Sumpfdottermotte*.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 36. *Dotterblumenscha-
benraupe* (*Calthae Palustris*); *Dotterblumenscha-
be*. Tin. *Calthella* L.

Fabric. S. E. p. 663. no. 47. Tin. *Calthella*. Nom.
Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 300. no. 64. Tin. *Calthella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 512. Tin. *Calthella*.
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 136. no. 1583. Tin. *Calthella*.

423. *Petiverella*, der *Rückenstrich*.

Müller l. c. p. 750. no. 423. die *Schleuder*.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 41. *Unbek. Raupe*.
Gelbgraue Goldschielende Schabe.

Fabric. S. E. p. 664. no. 49. Tin. *Petiverella*. Nom.
Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 300. no. 65. Tin. *Petiverella*.

Schaeff. Icon. t. 43. f. 33.

Mülleri *Zool. Dan. Pr.* p. 136. no. 1584. Tin. *Peti-
verella*. Nom. *Linn.*

424. *Swammerdammella*, das *Langhorn*.

Müller l. c. p. 751. no. 424. *Langhorn*.

Friesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 842. Tin. *Swammer-
dammella*. In den *Wiesen*.

Wien. Schmett. p. 141. D. no. 2. *Unbek. R. Bleich-
messingfarbene gewässerte Schabe*.

Der Drontheim. Gesellsch. Schr. III. p. 370. no. 36.
Tin. *Swammerdammella*.

Clerk Phal. t. 12. f. 1.

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

114 *Lepidoptera.* 233. *Phalaena Tinea.*

Fabric. S. E. p. 669. no. 13. *Alucita Swammer-*
dammella.

— *Spec. Inf.* II. p. 308. no. 17. Tin. *Swammerdam-*
mella.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1585. Tin. *Swam-*
merdammella. Nom. *Linn.*

425. *Reaumurella*, der Goldrand.

Müller l. c. p. 751. no. 425. der Goldrand.

Füesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 843. Tin. *Reaumure-*
rella.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 26. *Dotterweidenschä-*
benraupe (*Salicis Vitellinae*); *Dotterweidenschä-*
be. Tin. *Reaumurella* L.

Der *Dronth.* Gesellsch. Schr. IV. p. 287. no. 52.
Tin. *Reaumurella.*

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 92.

Clerk Phal. t. 12. f. 2.

Fabric. S. E. p. 670. no. 17. *Alucita Reaumurel-*
la. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 309. no. 22. Aluc. *Reaumure-*
rella.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1586. Tin. *Reaumure-*
murella.

Geoffr. Inf. II. p. 193. no. 28.

Tinea nigra, alis exterioribus deauratis, an-
tennis corpore duplo longioribus.

La Teigne noire bronzée.

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

426. *Degeerella*, der Silberrand.

Müller l. c. p. 751. no. 426. Silberrand.

Füesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 844. Tin. *Degeer-*
rella.

Wien.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 25. Unbek. R. Goldgestrichte Schabe mit gelbem Querbande.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 26. Goldgestreifte Schabe.

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 647.

Alae nigrae, fascia argenteo-aurea; antennae longae.

Long. lin. 2.

Fabric. S. E. p. 669. no. 15. *Alucita Degeerella*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 309. no. 20. *Aluc. Degeerella*.

Geoffr. Inf. II. p. 193. no. 29. t. 12. f. 5.

Tinea nigra, alis superioribus lineis longitudinalibus, fascia lata transversa, inferneque radiis plurimis aureis; antennis corpore triplo longioribus.

La Coquille d'or.

Long. $4\frac{1}{2}$ lign.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 497. Tin. *Degeerella*. Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1587. Tin. *Degeerella*.

Degeer Inf. I. t. 32. f. 13.

— Uebersf. 3 Quart. p. 99.

— Inf. Tom. II. P. I. p. 487. no. 6.

Phalène à antennes filiformes trois fois plus longues que le corps, & à trompe; à ailes pendantes bronzées traversées par une bande jaune bordée de violet.

Phalène-frigane bronzée à bande jaune.

— Uebersf. II Th. I B. p. 359. no. 6. die Erzfärbige gelbbandirte *Phryganäenphaläne*.

427. *Sulzella*, das Goldband. *)

H 2

Mül.

*) Nicht abgebildet. Diese hat Fabric. Spec. Inf. II. p. 309. no. 20. β. als eine Abänderung der *Degeerella* angeführt.

Müller l. c. p. 751. no. 427. Goldband.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 24. Unbek. R. Gold-
gestrichte Schabe mit schwarzem Querbande.

Geoffr. Inf. II. p. 199. no. 44.

Tinea nigra, alis exterioribus deauratis, capi-
tis vertice, alarumque fascia transversa flavis.

La Teigne dorée à bande & toupet jaunes.

Long. $2\frac{3}{4}$ lign.

428. *Podaella*, das Milchband. *)

Müller l. c. p. 751. no. 428. Milchband.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 845. Tin. *Podaella*.

Fabric. S. E. p. 670. no. 16. *Alucita Podaella*.

Nom. Linn.

--- Spec. Inf. II. p. 309. no. 21. Aluc. *Podaella*.

Geoffr. Inf. II. p. 194. no. 32. **)

Tinea nigra, fascia transversa alba.

La Teigne cordelière.

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

429. *Robertella*, das Weißeck. ***)

Müller l. c. p. 752. no. 429. die weiße Ecke.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 8. Unbek. R. Glän-
zende neblicht düstre Schabe.

Fabric. S. E. p. 669. no. 14. *Alucita Robertella*.

Nom. Linn.

--- Spec. Inf. II. p. 308. no. 18. Aluc. *Robertella*.

430. *Geoffrella*, das Silbergitter. †)

Müller l. c. p. 752. no. 430. Silbergitter.

Wien.

*) Nicht abgebildet.

**) Diese nach der Meynung der Wiener Entomol. p. 123. Linn.
Pyralis cingulata. no. 280.

***) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

*Wien. Schmett. p. 138. C. no. 19. Unbek. R. Oker-
gelbe Schabe mit Silberstrichen und zwey hell-
gelben Dreyecken.*

*Fabric. S. E. p. 664. no. 50. Tin. Geoffrella. Nom.
Linn.*

--- Spec. Inf. II. p. 301. no. 67. Tin. Geoffrella.

431. *Mouffetella, der Spitzflügel. *)*

Müller l. c. p. 752. no. 431. Spitzflügel.

*Wien. Schmett. p. 140. C. no. 57. Unbek. R. Röth-
lichgraue Schabe mit 8 schwarzen Punkten.*

*Fabric. S. E. p. 664. no. 51. Tin. Mouffetella. Nom.
Linn.*

--- Spec. Inf. II. p. 301. no. 68. Tin. Mouffetella.

*Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 499. Tin. Mouffe-
tella. Nom. Linn.*

--- Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1588. Tin. Mouffetella.

432. *Listerella, der Halbringel. **)*

Müller l. c. p. 752. no. 432. Halbringel.

*Wien. Schmett. p. 139. C. no. 30. Unbek. R. Trüb-
graue Schabe mit schwarzpunktirtem Unterran-
de.*

433. *Frischella, der Goldbraune Flügel. ***)*

Müller l. c. p. 752. no. 433. der Vergulder.

*Wien. Schmett. p. 140. C. no. 53. Unbek. R. Schmu-
zige Goldgeglättete Schabe.*

*Fabric. S. E. p. 663. no. 48. Tin. Frischella. Nom.
Linn.*

*--- Spec. Inf. II. p. 309. no. 19. Alucita Fri-
schella.*

H 3

Mül.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 498. Tin. *Frischella*.
la. Nom. Linn.

--- Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1589. Tin. *Frischella*.

434. *Scopotella*, der Goldsprenkel. *)

Müller l. c. p. 753. no. 434. Goldsprenkel.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 1. Unbek. R. Schwärzlichte Schabe mit 8 weißen Punkten.

435. *Albinella*, der Goldbogen. **)

Müller l. c. p. 753. no. 435. Goldbogen.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 91.

436. *Goedartella*, der Silberbogen. ***)

Müller l. c. p. 753. no. 436. Silberbogen.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 558. no. 15. Tin. *Goedartella*, die Goldfarbige Elfenmotte mit der doppelten Silberweißen Binde.

Clerk Phal. t. 12. f. 14.

Fabric. S. E. p. 664. no. 33. Tin. *Goedartella*.

Alis auratis; fasciis duabus punctisque tribus argenteis.

--- *Spec. Inf.* II. p. 302. no. 72. Tin. *Goedartella*.
In Alnetis; in *Betulae* gemmis.

437. *Loevenhoekella*, die Silberlinie. †)

Müller l. c. p. 753. no. 437. Silberlinie.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 76. Unbek. R. Kupferglänzende Schabe mit 12 Silber- oder Blausgoldflecken.

438. *Merianella*, das Silberblättchen.

Müller l. c. p. 753. no. 438. Silberblättchen.

Wien.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 31. *Unbek. R. Pur-*
purgoldne Schabe mit 3 blafs goldnen Querbän-
dern.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 90.

Fabric. S. E. p. 664. no. 54. *Tinea Merianella.*
Nom. *Linn.*

--- *Spec. Inf.* II. p. 302. no. 73. *Tin. Merianella.*

Geoffr. Inf. II. p. 198. no. 43.

Tinea nigro-aurata lineis argenteis transver-
sis tribus, antennis extremo-albis.

La Teigne dorée à bandes d'argent.

Long. 1 lign.

Aët. Upsal. 1736. p. 26. no. 84.

Papilio alis depressis oblongis argenteis, li-
neis tribus transversis aureis, media bifurca.

439. *Wilkella*, das *Bogenband*.

Müller l. c. p. 754. no. 439. *Bogenband*.

Réaum. Inf. III. t. 4. f. 8.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 89.

Fabric. S. E. p. 664. no. 55. *Tin. Wilkella.* Nom.
Linn.

--- *Spec. Inf.* II. p. 302. no. 74. *Tin. Wilkella.*

Geoffr. Inf. II. p. 199. no. 43. β .

Tinea nigro-aurata, lineis argenteis transver-
sis quatuor, antennis nigris.

Long. $1\frac{3}{4}$ lign.

(Variet. *Merianellae*).

440. *Lyonetella*, die *Silberspalte*. *)

Müller l. c. p. 754. no. 440. *Silberrostral*.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 94.

Fabric. S. E. p. 665. no. 56. *Tin. Lyonetella.* Nom.
Linn.

H 4

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 302. no. 77. Tin. Lyonetella.

441. *Bonnetella*, die *Silberwelle*. *)

Müller l. c. p. 754. no. 441. Wellenfilber.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 93.

Fabric. S. E. p. 665. no. 57. Tin. Bonnetella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 303. no. 78. Tin. Bonnetella.*

442. *Iungiella*, der *Siebenfleck*.

Müller l. c. p. 754. no. 442. Verdoppeler.

Clerk Phal. t. 12. f. 9.

Cathol. I. p. 405. Iungiella.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1594. Tin. Iungiella. Nom. Linn.

443. *Schefferella*, der *Buchblattminirer*. **)

Müller l. c. p. 754. no. 443. Büchenwühler.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 600. no. 4. Tin. Schefferella, die kleine schwarze und gelbgefleckte Buchmotte.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 21. Büchenblattschabenraupe (in Fagi Sylvaticae foliis); Büchenblattschabe. Tin. Schefferella L.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 27. Büchenminirer.

Fabric. S. E. p. 665. no. 58. Tin. Schefferella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 303. no. 79. Tin. Schefferella.*

444. *Rhediella*, die *gebrochene Silberlinie*.

Müller l. c. p. 755. no. 444. Bruchsilber.

Clerk Phal. t. 12. f. 12.

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 665. no. 59. Tin. Rhediella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 303. no. 82. Tin. Rhediella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 500. Tin. Rhediella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1591. Tin. Rhediella.*

445. *Roesella*, der *Apfelblattminirer*. *)

Müller l. c. p. 755. no. 445. Silberbuckel.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 847. Tin. Roesella.

Frisch Inf. III. p. 31. no. 15. 3 Pl. t. 4. f. 7. von den Räupelein unter der Pflaumenblatthaut.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 790. no. 20. Tin. Roesella, die aller kleinste Blattmotte des Apfelblatts.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 30. Apfelblattschabensraupe (in Pyri Mali foliis); Apfelblattschabe. Tin. Roesella L.

Fabric. S. E. p. 665. no. 60. Tin. Roesella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 303. no. 83. Tin. Roesella.*

Larva 14-poda, flava, capite testaceo.

Pupa nuda, oblonga, brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 501. Tin. Roesella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1592. Tin. Roesella.*

Degeer Inf. I. t. 30. f. 10-12.

— *Uebersf. I. 3 Quart. p. 36.*

— *Inf. Tom. II. Part. I. p. 495. no. 6.*

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes étroites couleur de bronze doré à taches argentées, mais sans point noir.

H 5

Phalène-

*) Vermuthlich einerley mit *Mülleri* Tin. *Maestingella*. *Faun. Fr. p. 58. no. 521. Alis flavis linea maculisque niveis.* — *Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1603. Hierbey auch Frisch, III. t. 4. f. 7.*

Phaléne - teigne dorée à taches argentées du Pommier.

— *Uebersf. II Th. I B. p. 366. no. 6. die goldne Silbergefleckte Apfelmottenphaläne.*

Réaum. Inf. III. t. 4. f. 11-15.

446. *Linneella*, der Silberpunkt.

Müller l. c. p. 755. no. 446. der Autor.

Clerk Phal. t. 12. f. 8.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 446. Tin. Linneella.

Fabric. S. E. p. 666. no. 61. Tin. Linneella.

Alis fusco-auratis; punctis quatuor argenteis elevatis.

— *Spec. Inf. II. p. 304. no. 84. Tin. Linneella.*

Geoffr. Inf. II. p. 200. no. 45.

Tinea flavo-aurata, punctis quatuor argenteis, antennarumque apice albo. Vulgo Linnaeella.

La Teigne dorée à quatre points d'argent.

Long. $2\frac{1}{3}$ lign.

447. *Rajella*, der Erlenblattminirer.

Müller l. c. p. 755. no. 447. Erlenmotte.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 558. no. 16. Tin. Rajella, die kleine Goldfarbige, Silberweiße gedüpfelte Erlenmotte.

Swammerd. Bib. der Nat. Fol. p. 298. t. 44. f. 18-21. von den Würmern zwischen den beyden Häuten der Erlenblätter.

Wien, Schmiett. p. 143. D. no. 32. Erlenblattschabenraupe (in Betulae Alni foliis); Erlenblattschabe. Tin. Rajella L.

Fabric. S. E. p. 666. no. 62. Tin. Rajella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 304. no. 85. Tin. Rajella.*

Larva

Larva pallida, capite utrinque puncto testaceo.

Pupa oblonga mucrone dentato intra folliculum extus excrementis tectum.

Degeer Inf. I. t. 31. f. 11. 12.

— *Uebers.* I. 3 Quart. p. 40.

— Inf. Tom. II. P. I. p. 495. no. 5.

Phalène à antennes filiformes, à trompe; à ailes étroites élevées dorées à taches argentées, avec un point noir proche du bout.

Phalène-teigne dorée à taches argentées de l'Aune.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 366. no. 5. die goldne, Silbergefleckte Erlenminir-Mottenphaläne.

448. *Brunnichella*, die Violetbinde. *)

Müller l. c. p. 755. no. 448. Violetlinie.

449. *Harrisella*, die Brandspitze. **)

Müller l. c. p. 756. no. 449. Brandspitze.

Fabric. S. E. p. 666. no. 63. Tin. *Harrisella*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 305. no. 88. Tin. *Harrisella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 502. Tin. *Harrisella*. Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1593. Tin. *Harrisella*.

450. *Clerckella*, die Schwanzmotte. ***)

Müller l. c. p. 756. no. 450. Schwanzmotte.

Fabric. S. E. p. 666. no. 66. Tin. *Clerckella*.

Alis argenteis, postice subcaudatis, fusco-striatis punctoque atro.

— Spec. Inf. II. p. 305. no. 93. Tin. *Clerckella*.

In

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

In Europae Nemoribus.

451. *Occultella*, die Fenstermotte. *)*Müller* l. c. p. 756. no. 451. Fenstermotte.*Degeer* Inf. I. Uebersf. 3 Quart. p. 32.452. *Lichenella*, die Moosmotte.*Müller* l. c. p. 756. no. 452. Flechtenmotte.*Degeer* Uebersf. I. 3 Quart. p. 78.— Inf. Tom. II. Part. I. p. 380. no. 4. t. II. f. 5.
6.*Phalène* à antennes filiformes, sans trompe, dont la femelle est sans ailes; d'une chenille-teigne des murs à fourreau prismatique fait de grains de pierre.*Phalène-teigne des murs à court fourreau prismatique.*— Uebersf. II Th. I B. p. 276. no. 4. t. II. f. 1. 6.
die Mauermottenphaläne mit kurzem dreyeckigem Gehäuse.*Fabric.* Spec. Inf. II. p. 306. no. 94. Tin. *Lichenella*.

Aptera laevis nigra.

Larva 16-poda, laevis, obscure grisea, postice incrassata, intra cucullum triangulari prismaticum ex arena constructum.

Unabgebildete Linnéische Motten.

1) no. 353. *Crataegella*.2) no. 357. *Oxyocanthella*.3) no. 359. *Pascuella*.4) no. 362. *Rorella*.5) no. 364. *Nemorella*.6) no. 366. *Ramella*.7) no. 370. *Vestionella*.

8) no.

*) Nicht abgebildet.

- 8) no. 380. *Arbutella.*
- 9) no. 381. *Tessella.*
- 10) no. 384. *Parenthesella.*
- 11) no. 385. *Elongella.*
- 12) no. 386. *Punctella.*
- 13) no. 388. *Tetrapodella.*
- 14) no. 390. *Cinctella.*
- 15) no. 391. *Leucatella.*
- 16) no. 392. *Cinerella.*
- 17) no. 393. *Trigonella.*
- 18) no. 394. *Rhomboidella.*
- 19) no. 395. *Tertianella.*
- 20) no. 396. *Scabrella.*
- 21) no. 397. *Asperella.*
- 22) no. 398. *Serratella.*
- 23) no. 399. *Populella.*
- 24) no. 400. *Mercurella.*
- 25) no. 405. *Cembrella.*
- 26) no. 408. *Iuniperella.*
- 27) no. 409. *Fuscella.*
- 28) no. 410. *Minutella.*
- 29) no. 411. *Corticella.*
- 30) no. 413. *Sylvella.*
- 31) no. 416. *Aristella.*
- 32) no. 417. *Caudella.*
- 33) no. 418. *Capitella.*
- 34) no. 420. *Pedella.*
- 35) no. 422. *Calthella.*
- 36) no. 427. *Sulzella.*
- 37) no. 428. *Podaella.*
- 38) no. 429. *Robertella.*
- 39) no. 430. *Geoffrella.*
- 40) no. 431. *Mouffetella.*
- 41) no. 432. *Listerella.*
- 42) no. 433. *Frischella.*

43) no.

- 43) no. 434. *Scopolella.*
- 44) no. 435. *Abinella.*
- 45) no. 437. *Loevenhoekella.*
- 46) no. 440. *Lyonetella.*
- 47) no. 441. *Bonnetella.*
- 48) no. 443. *Schefferella.*
- 49) no. 448. *Brunnichella.*
- 50) no. 450. *Clerckella.*
- 51) no. 451. *Occultella.*

Neue Arten von Motten.

1. *Tinea cauda piscina*, die *Fischschwanzmotte*.
Naturforscher II St. p. 14. t. I. f. 6. (D. Kühn.)
2. *Aureo-polita*, der *Goldglanz*.
Naturforscher III. p. 8. f) t. I. f. 8. (D. Kühn.)
Füßl. Magaz. der Entomol. II. p. 107.
Schaeff. Icon. t. 19. f. 4. 5.
3. *Quadrioculata*, das *Vierauge*.
Naturforscher III. p. 8. g) t. I. f. 9. die fahlbraune vieräugige Motte, welche fast die Gestalt einer Frühlingsfliege hat (D. Kühn).
Füßl. Magaz. der Entom. II. p. 107.
Schaeff. Icon. t. 278. f. 4-7.
4. *Aleella*, die *gelbbraunrothgefleckte Motte*.
Naturforscher IX. p. 106. t. 2. (Schulze).
 Alis oblongis flavis, maculis fulvis alternis,
 strigaeque undulata argentea.
 In *Germaniae Pratis*.
5. *Chocolatella*, die *Chokolatenmotte*.

Bonnets Betracht. über die Natur p. 457. (Note *Spallanzani*).

Martini allgem. Gesch. der Nat. I. p. 633.

Alis griseis, pallide-flavis, nigro-punctatis maculatisque.

6. *Fueslinella*, die *Füßlismotte*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 13. die Vorderflügel schwarz; die hintern braun; auf dem Kopfe und zu beyden Seiten des Bruststücks Orangelbe Flecken; auf den Vorderflügeln weisse Tropfen.

7. *Proboscidella*, der *Schnauzbart*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 14. die Flügel braun, mit einem Goldgelben Bande der Länge nach durchzogen, nebst einem rothgelben Fleck und Saum.

8. *Viciella*, *Wickenschabe*.

Wien. Schmett. p. 133. A. *Scheinspinner*schaben (Ph. Tin. Bombyciformes): no. 2. *Wickenschabenraupe* (*Viciae Sylvaticae*), Tab. I. a. f. 7. *Wickenschabe*, Tab. I. b. f. 7.

Geoffr. Inf. II. p. 203. no. 52.

Tinea involucro ex paleis transversis composito.

La Teigne à fourreau de pailles transverses.

Fourreau à sept à huit lignes de long.

Degeer Inf. I. p. 511. t. 29. f. 23-25.

Chenille-teigne à seize jambes, rase, noirâtre, qui vit sur l'Ozier, & qui se fait un fourreau couvert de brins de gramen, qui sont placés transversalement sur le fourreau.

Uebers. I. 3 Quart. p. 80. t. 29. f. 23-25.

9. *Muscella*,

9. *Muscella*, Fliegenflüchtige Schabe.

Wien. Schmett. p. 133. A. no. 3. Unbek. Raupe.

10. *Bombycella*, gelblichte düstere gewässerte Schabe.

Wien. Schmett. p. 133. A. no. 4. Unbek. R.

11. *Pectinella*, Aschgraue durchsichtige Schabe.

Wien. Schmett. p. 133. A. no. 5. Unbek. R.

12. *Plumella*, schwärzlichte Schabe.

Wien. Schmett. p. 133. A. no. 6. Unbek. R.

13. *Palpella*, braungelblichte Schabe mit 2 geraden Silberstreifen.

Wien. Schmett. p. 134. B. Geradschnauzigte Schaben, Ph. Tin. *Direotipalpes*: no. 3. Unbek. R.

14. *Margaritella*, braune Schabe mit Silberartigem Geradstreife.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 5. Unbek. R.

Geoffr. Inf. II. p. 183. no. 3.

Tinea cinerea, corniculis duobus cristatis, fascia alarum longitudinali argentea.

La Teigne à rayure d'argent.

Long. 4 lign.

15. *Conchella*, gelbbraune Schabe mit 2 Silberartigen Flecken.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 6. Unbek. R.

16. *Inquinatella*, gelblichte am Innenrande trübe Schabe.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 10. Unbek. R.

17. *Exoletella*, Beinfarbene graugestrichte Schabe.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 12. Unbek. R.

18. *Straminella*, *Strohfarbige Schabe.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 13. Unbek. R.
19. *Luteella*, *Okergelbe Schabe.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 14. Unbek. R.
20. *Convolutella*, *Lichtgraue Schabe.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 15. Unbek. R.
21. *Falsella*, *weißlichglänzende dunkelgezeichnete Schabe.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 16. Unbek. R.
22. *Tristella*, *grau und braungemischte Schabe.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 17. Unbek. R.
23. *Quercella*, *Eichenschabe.*
Wien. Schmett. p. 134. B. no. 18. Eichenschabenraupe (Quercus Roboris).
24. *Antennella*, *gelblichte, weißschielende Schabe.*
Wien. Schmett. p. 135. B. no. 19. Unbek. R.
25. *Pyralella*, *weißlichte Schabe mit grauen Quersflecken.*
Wien. Schmett. p. 135. B. no. 20. Unbek. R.
26. *Alpella*, *bläuschwefelgelbe olivgestrichte Schabe.*
Wien. Schmett. p. 135. B. no. 21. Unbek. R.
27. *Ceruffella*, *graue Schabe mit silberner Untenrandlinie.*
Wien. Schmett. p. 135. B. no. 22. Unbek. R.
28. *Quadrella*, *weiße Schabe mit gestrichtem Untenrande.*

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 23. Unbek. R.

29. *Striatella*, graue Schabe mit weißen Geradstri-
chen.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 26. Unbek. R.

30. *Gigantella*, grosse graugelbe Schabe mit langen
Schnauzen.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 27. Unbek. R.

31. *Argyrella*, silberne graugesprenkelte Schabe.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 28. Unbek. R.

32. *Anella*, graugemischte Schabe mit 2 Mittelrin-
gen.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 30. Unbek. R.

33. *Canella*, grauröthliche Schabe ohne Ringe.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 31. Unbek. R.

34. *Ahenella*, glänzende schwarzgraulichte Schabe.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 32. Unbek. R.

35. *Alternella*, weifsgraue Schabe mit breiten düstern
Querstreifen.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 33. Unbek. R.

36. *Fagella*, Büchenschabe.

*Wien. Schmett. p. 135. B. no. 34. Buchenschaben-
raupe (Fagi Sylvaticae).*

37. *Noctuella*, bräunlichte Schabe mit düstern Ring-
und Nierenflecken.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 35. Unbek. R.

38. *Verbascella*, Wollkrautschabe.

Wien.

*Wien. Schmett. p. 136. B. no. 36. Wollkrautschaben-
raupe (Verbasci Tapfi).*

39. *Daphnella, Zeidelbastschabe.*

*Wien. Schmett. p. 136. B. no. 37. Zeidelbastschaben-
raupe (Daphnes Mezerei).*

40. *Nyctemerella, weisse Schabe mit schwarzen Rand-
fleckcn.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 38. Unbek. R.

41. *Dilutella, graue, düstergezeichnete Schabe.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 40. Unbek. R.

42. *Barbella, dunkelgraue Schabe.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 43. Unbek. R.

43. *Bracteella, rothgoldene Schabe.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 44. Unbek. R.

44. *Falcella, gelbbraune Schabe mit gefichelten Ober-
flügeln.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 47. Unbek. R.

45. *Apicella, graugelbe Schabe mit spitzigem Aussen-
winkel der Oberflügel.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 48. Unbek. R.

46. *Uncella, Erdfarben und weissgemischte Schabe mit
geficheltem Aussenwinkel der Oberflügel.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 49. Unbek. R.

47. *Harpella, Zimmetbraune Schabe mit gelbem In-
nenrande und gefichelten Oberflügeln.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 50. Unbek. R.

48. *Ciliella*, goldbraune Schabe.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 51. *Unbek. R.*

49. *Genistella*, Gilbkrautschabe.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 52. *Gilbkrautschaben-
raupe (Genistae tinctoriae).*

50. *Pyropella*, bleichgelbe Schabe mit finsterem Auf-
senrande.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 53. *Unbek. R.*

51. *Albidella*, weissgraue Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 56. *Unbek. R.*

52. *Humerella*, Okerbraune Schabe mit weissem Auf-
senrande der Oberflügel.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 57. *Unbek. R.*

53. *Nitidella*, Silberweisse Schabe mit goldfarbiger
Zeichnung.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 58. *Unbek. R.*

54. *Mendicella*, schwarzbraune Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 59. *Unbek. R.*

55. *Choragella*, glänzend Holzfarbichte dunkelge-
zeichnete Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. C. *Krummschnauzichte Scha-
ben, Ph. Tin. Recurvipalpes:* no. 1. *Unbek. R.*

56. *Characterella*, graulichte Schabe mit Sförmigem
Mittelzeichen.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 2. *Unbek. R.*

57. *Arenella*, bleichsandfarbige Schabe mit Bleyfarbe-
nem Mittelpunkt.

Wien.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 3. Unbek. R.

58. *Liturella*, gelblichte Schabe mit niederen dunklen Flecken.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 4. Unbek. R.

59. *Daucella*, Möhrenschabe.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 5. Möhrenschabenraupe (Dauci Carotae).

60. *Atomella*, graulichte dunkelgesprengte Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 6. Unbek. R.

61. *Laterella*, Ziegelfarbige Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 7. Unbek. R.

62. *Verrucella*, vorwärts Zimmetrothe, rückwärts düstere Schabe mit einer Warze.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 8. *)

63. *Lobella*, graue Schabe mit 3 schwarzen Hökern.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 9. Unbek. R.

64. *Putridella*, Holzbräunliche Schabe mit einem kleinen weissen Mittelpunkt.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 10. Unbek. R.

65. *Monilella*, weisslichte Schabe mit einem bunten Makel am Aussenrande.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 11. Unbek. R.

66. *Roborella*, Hageeichenschabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 14. Hageeichenschabenraupe (Quercus Roboris).

*) Die Raupe auf dem Kellerhals oder Zeiland, Daphne Mezereum.
S. Nachtrag p. 319. Note.

67. *Palumbella*, graue Schabe mit 2 röthlichen Querstrichen.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 15. Unbek. R.

68. *Abietella*, Tannenschabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 19. Tannenschabenraupe. (Pini abietis. Clusf.)

69. *Adscitella*, grauglänzende Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 20. Unbek. R.

70. *Procerella*, goldgelbe Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 21. Unbek. R.

71. *Tetricella*, düsterglänzende Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 22. Unbek. R.

72. *Denifella*, gelbgraue weissgefleckte Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 23. Unbek. R.

73. *Lipsiella*, Hirschfarbene Schabe mit einer weislichten Nerve.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 24. Unbek. R.

74. *Tremella*, Zitterpappelschabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 27. Unbek. R.

75. *Cristella*, hellgraue Schabe mit schwarzen Randflecken.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 28. Unbek. R.

76. *Turpella*, düster und blafsgraugemischte Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 29. Unbek. R.

77. *Umbrella*, graugelbe glänzende Schabe mit düstern Flecken.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 31. Unbek. R.

78. Ob.

78. *Obsoletella*, Staubfarbige Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 32. Unbek. R.

79. *Plumbella*, Bleyfarbene Schabe mit schwarzer Mittelmakel und schwarzen Punkten.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 34. Unbek. R.

80. *Violella*, glänzende düster Veilrothe Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 35. Unbek. R.

81. *Laevigella*, braune Schabe mit Goldstäubchen.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 36. Unbek. R.

82. *Laetella*, glänzend braungemischte Schabe mit weissem Kopfe und Rücken.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 37. Unbek. R.

83. *Rhombella*, Holzfarbige schwarzgezeichnete Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 38. Unbek. R.

84. *Obscurella*, düstere Schabe mit bleichem Aussenrandpunkte.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 39. Unbek. R.

85. *Aquella*, bleiche Schabe mit dunkler Zeichnung.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 40. Unbek. R.

86. *Alabastrella*, weisse Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 41. Unbek. R.

Geoffr. Inf. II. p. 168. no. 115.

Phalaena seticornis spirilinguis alba, oculis nigris, antennis pedibusque subflavescentibus.

L' albâtre.

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

87. *Vulgella*, graue Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 44. Unbek. R.

88. *Terfella*, bleiche Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 45. Unbek. R.

89. *Sisymbrella, Wellensamenschabe.*

*Wien. Schmett. p. 140. C. no. 46. Wellensamen-
schabenraupe (Sisymbrii Sophiae).*

90. *Formosella, gelbe Schabe mit silbernem Außen-
randmakel.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 47. Unbek. R.

91. *Pedisequilla, bleichglänzende Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 48. Unbek. R.

92. *Terrella, röthlichgraue Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 49. Unbek. R.

93. *Laminella, glänzende dunkelstahlgrüne Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 51. Unbek. R.

94. *Nebulella, Aschgraue Schabe mit schwarzen Punk-
ten.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 52. Unbek. R.

95. *Echiella, Natterkopfschabe.*

*Wien. Schmett. p. 140. C. no. 54. Natterkopfscha-
benraupe (Echii vulgaris).*

96. *Derafella, bleichbraune Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 56. Unbek. R.

97. *Cuspidella, schwarzbraune Schabe mit 4 weißli-
chen Streifen.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 58. Unbek. R.

98. *Micella, stahlgrüne Schabe mit blausilbernen
Punkten.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 59. Unbek. R.

99. *Atrella,*

99. *Atrella*, blauschwarze Schabe mit 4 weißen Punkten.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 60. Unbek. R.

100. *Pennella*, Silberweißgestrichte Schabe.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 61. Unbek. R.

101. *Eburnella*, Helfenbeinfarbene gelbgestrichte Schabe.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 63. Unbek. R.

102. *Variella*, graue bleichgefleckte Schabe.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 64. Unbek. R.

103. *Epilobiella*, Weidrichsröschenschabe.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 65. Weidrichsröschenschabenraupe (*Epilobii hirsuti*).

104. *Sparsella*, weißliche schwarzgesprengte Schabe.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 67. Unbek. R.

105. *Nanella*, schwarzgrau und weißgemischte Schabe.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 68. Unbek. R.

106. *Opimella*, bräunlichte Schabe mit silbernem Mittelraume.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 69. Unbek. R.

107. *Pygmaeella*, Goldfarbige Schabe mit bleichem Innenrande.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 70. Unbek. R.

108. *Locupletella*, goldene und silberne Schabe mit düsterm Untenrande.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 71. Unbek. R.

109. *Dimidiella*, halbgelb und halbschwarze Schabe.
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 72. Unbek. R.

110. *Pumilella*, weiß und graue Schabe.
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 73. Unbek. R.

111. *Accessella*, graubraune Schabe mit bleichgelben
Flecken.
Wien. Schmett. p. 141. C. no. 74. Unbek. R.

112. *Majorella*, goldbraun gezeichnete Schabe.
Wien. Schmett. p. 141. D. Schnauzenlose Schaben,
Ph. Tin. Impalpes: no. 1. Unbek. R.

113. *Membranella*, mattgelbe durchsichtige Schabe.
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 3. Unbek. R.

114. *Rubricella*, braunröthliche kleingestrichte Schabe.
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 5. Unbek. R.

115. *Pilella*, glänzend düstergraue Schabe.
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 6. Unbek. R.

116. *Ephemerella*, weißliche fast durchsichtige Schabe.
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 9. Unbek. R.

117. *Spretella*, Aschgraue Schabe mit schwarzen
Punkten.
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 10. Unbek. R.

118. *Maurella*, glänzendschwarze Schabe.
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 11. Unbek. R.

119. *Ferrugella*, Goldgelbe bräunlichgemischte Scha-
be.
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 14. Unbek. R.

120. *Pronubella*, Trübgoldschielende Schabe mit gelben Unterflügeln.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 16. Unbek. R.

121. *Taurella*, grau und schwärzlichte Schabe mit knottigen Fühlhörnern.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 17. Unbek. R.

122. *Miscella*, düstergelb und blaugemischte Schabe mit Hökern.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 18. Unbek. R.

123. *Aurella*, rothgoldene Schabe mit silbernem Querbande.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 19. Unbek. R.

124. *Schiffermillerella*, rothgoldene Schabe mit stahlblauem Querbande.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 20. Unbek. R.

125. *Exiguella*, düstere Schabe mit weislichem Querstriche.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 21. Unbek. R.

126. *Flavifrontella*, grauglänzende Schabe mit gelbem Kopfe.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 22. Unbek. R.

127. *Obviella*, Aschgraue Schabe mit gelblichem Innenrande.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 23. Unbek. R.

128. *Albinigrella*, schwärzlichte Schabe mit 8 weissen Makeln.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 27. Unbek. R.

129. *Masculella*, grauglänzende Schabe mit zwey weissen Innenrandpunkten.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 28. Unbek. R.

130. *Fibulella*, Purpurschielende Schabe mit einem goldenen Gemeinmakel.

Wien.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 33. Unbek. R.

131. *Metallella*, dunkelgoldne Schabe mit 6 Silberzeichen.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 34. Unbek. R.

132. *Cydoniella*, Quittenblattschabe.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 35. Quittenblattschabenraupe (in *Pyri Cydoniae foliis*).

133. *Rejessella*, grauglänzende Schabe mit einem schwärzlichen Punkte.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 37. Unbek. R.

134. *Irella*, grauliche dunkelgefleckte Schabe.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 39. Unbek. R.

135. *Alucitella*, goldglänzende Schabe mit 2 düstern Quersflecken.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 40. Unbek. R.

136. *Hemidactylella*, oraniengelbe rothbraunpunktirte Schabe.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 41. Unbek. R.

137. *Microdactylella*, weisse Schabe mit Goldgelben Winkelstreifen.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 42. Unbek. R.

138. *Hirsutella*, Schwingelschabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. ad A. Schwingelschabenraupe (*Festucae ovinae et elatioris*).

139. *Legatella*, breitflüglichte graue Schabe mit einem langen Silberstreife.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

140. *Tribunella*, breitflüglichte graue Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

141. *Centuriella*, blafsgraue braungelb und düfterfle-
ckichte Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

142. *Combinella*, Silberweifse, auswärts braungelbe
Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

143. *Marginella*, glänzende bräunliche Schabe mit ei-
ner weifsen Außenrandlinie.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

144. *Tripunctella*, Flachsbräunliche Schabe mit drey
schwarzen Punkten.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

145. *Perficella*, Pfirsichschabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Pfirsichschaben-
raupe (*Amygdali Perficæ*).

146. *Bififfella*, Pflaumenschabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Pflaumenscha-
benraupe (*Pruni domesticæ*).

147. *Ornatella*, hellbraune blaulichtweifsgestrichelte
Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

148. *Ligulella*, Sammetfchwarze Schabe mit einem
weifsen Querftriche.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

149. *Festivella*, Goldgelb und Silberweifß gemifchte
Schabe mit erhobenen braunen Fleckchen.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

150. *Albipunctella*, Rufffarbene Schabe mit 3 weifsen
Punkten.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

151. *Aeneella*, grünlichtgoldene Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

152. *Minimella*, düstergoldne Schabe.
Wien. Schmiett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.
153. *Splendella*, blankbraune Schabe mit röthlichsilber-
nem Innenrande und Punkte.
Wien. Schmiett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.
154. *Cuprella*, ganz rothgoldne Schabe.
Wien. Schmiett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.
155. *Rupella*, dunkelrothgoldene Schabe mit 4 runden
Silbermakeln.
Wien. Schmiett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.
156. *Praelatella*, blankveilrothe Schabe mit 2 silbernen
Eckmakeln und einem Querstriche.
Wien. Schmiett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.
157. *Argyrodaetyla*, silberne Schabe mit schwarzgestri-
cheltem Untenrande und Kielförmigen Unterflü-
geln.
Wien. Schmiett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.
158. *Erythrodaetyla*, röthlichgelbe dunkelrothfleckichte
Schabe.
Wien. Schmiett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.
159. *Perlrella*, die Perlmotte.
Scop. Entom. carn. p. 243. no. 620.
Alae supra eodem prorsus, quo perla, colore
fulgidae; subtus fuscescentes.
In Pratis. Long. lin. 6.
Wien. Schmiett. p. 134. B. no. 11. glänzend Perlfar-
bichte Schabe. Unbek. R.
Knochs Beytr. zur Insektengesch. I St. p. 68. t. 4. f.
6. Ph. Tin. Perlrella, die Perlmotte.
Tinea alis oblongis margaritato. fulgidis, sub-
tus furvis.

160. *Semirubella*, der *Halbröthling*.

Scop. Entom. carn. p. 245. no. 623.

Alae anticae vinaceae, femipaleaceae.

In *Gramineis*. *Long. lin. 6.*

161. *Rosella*, die *halbrosenfarbige Motte*.

Scop. Ent. carn. p. 245. no. 624.

Alae anticae albae, femiroseae. Occiput aureum.

In *herbidis collibus*. *Long. lin. 4.*

162. *Viduellia*, der *Einsiedler*.

Scop. Ent. carn. p. 245. no. 625.

Alae anticae albae; linea fusca, a basi ad apicem prope marginem crassiore decurrente.

In *Sylvis*, rarior et solitaria. *Long. lin. 4 $\frac{1}{3}$.*

163. *Fuscella*, der *Braunpunkt*.

Scop. Ent. carn. p. 245. no. 626.

Alae canescentes, fusco-punctatae.

In *montanis nostris*. *Long. lin. 4.*

164. *Craterella*, die *Achtlinie*.

Scop. Ent. carn. p. 246. no. 627.

Alae anticae albae; lineis longitudinalibus octo binisque transversis ferrugineis.

In *Gramine*. *Long. lin. 5 $\frac{1}{3}$.*

165. *Chrysonuchella*, der *Streupunkt*.

Scop. Ent. carn. p. 246. no. 628.

Alae albae, margine crassiore, punctulis sparsis, strigisque binis transversis fuscescentibus.

In *pratis*. *Long. lin. 5 $\frac{2}{3}$.*

144 *Lepidoptera. 233. Phalaena Tinea.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 8. *weisslichte Schabe*
mit einem Silberbogen und Untenrande. Unbek.
R.

166. *Virginella*, das Jüngferchen.

Scop. Ent. carn. p. 246. no. 629.

Pallida tota et albicans; alis anticis maculis
duabus albissimis, anteriore conica, posteriore
quadrata.

In *Nemoribus*. Long. lin. 5.

167. *Cornutella*, das Zweyhorn.

Scop. Ent. carn. p. 247. no. 633.

Tota ossea et polita; palpis *erectis*.

In *pratis*. Long. lin. $5\frac{1}{2}$.

168. *Marginella*, der Blafsrand.

Scop. Ent. carn. p. 248. no. 635.

Pallide caryophyllina; alis anticis margine
crassiore pallidior punctisque (6-7) caryophyl-
linis variegato, fimbria subargentea.

In *Pomariis* circa Idriam. Long. lin. $3\frac{1}{2}$.

169. *Palliatella*, das Schwarzauge.

Scop. Ent. carn. p. 248. no. 636.

Ossea tota, alis impositis, oculis nigris.

In *Nemoribus* nostris. Long. lin. 7.

170. *Cervinella*, die Hirschhornfarbige Motte.

Scop. Ent. carn. p. 248. no. 637.

Alae *cervinae*; anticae punctis posticis nigris
(4) in margine crassiore, (7) in exteriore. Cor-
pus subtus subargenteum.

In *Pratis*. Long. lin. $5\frac{1}{2}$.

171. *Forficella*, der Goldkopf.

Scop. Ent. carn. p. 248. no. 638.

Alae

Alae anticae fusco-ferrugineae; capite, striga a basi ad angulum posticum extensa, maculaque obliqua postica marginis crassioris, subaurei coloris.

In Sylvis. Long. lin. 5.

172. *Flavella*, der Gelbling.

Scop. Ent. carn. p. 249. no. 639.

Caput, dorsum, alae anticae supra flavae ferrugineo-subfasciatae.

In Nemoribus umbrosis. Long. lin. $4\frac{1}{2}$.

173. *Gemmatella*, die Juwelenmotte.

Scop. Ent. carn. p. 249. no. 640.

Alae anticae flavescentes; fasciis ferrugineis punctisque argenteis variegatae.

In Collibus nostris. Long. lin. $3\frac{3}{4}$.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 25. Gelblichte Schabe mit zwey bräunlichten Bändern. Unbek. R.

174. *Eclipsella*, der Dickrand.

Scop. Ent. carn. p. 249. no. 641.

Obscure cana; alis anticis margine crassiore nigro-punctatis.

In Pratis. Long. $3\frac{1}{3}$.

175. *Mucronella*, der Lanzettenflügel.

Scop. Ent. carn. p. 250. no. 643.

Alae omnes lanceolatae, mucronatae, nitidae, concolores, pallidae; anticae longitudinaliter fusco-sublineatae.

Unicam collegi circa Idriam.

Long. lin. $6\frac{1}{2}$.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 45. Unreinstrohfärbichte Schabe. Unbek. R.

176. *Scabiosella*, die *Skabiosenmotte*.

Scop. Ent. carn. p. 250. no. 644.

Alae anticae auratae, margine subtusque una cum posticis utrinque haematiticae lucidae. Antennae alis longiores, albae, basi nigricantes.

In Floribus *Scabiosae officin.*

Long. lin. 4.

Poda Mus. Graec. p. 94. *Metallica.*

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 848. Tin. *Scabiosella* *Scop.* Auf den wilden *Skabiosen*.

Sulzer's Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 16. die *Skabiosenmotte*.

177. *Viridella*, der *Goldgrünling*.

Scop. Ent. carn. p. 250. no. 645.

Alae anticae viridi-auratae. Femora postica barbata.

In *Sylvis Idriensibus.* *Long.* lin. $3\frac{1}{3}$.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 4. *Mattgrüngoldglänzende Schabe.* *Unbek. R.*

178. *Barbatella*, der *Bartling*.

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 646.

Alae anticae glaucae, aurato-punctatae. *Palpi barbati.* Antennae alis longiores, apice albidae.

In *Collibus gramineis Carnioliae super.*

Long. lin. $2\frac{1}{3}$.

179. *Croesella*, die *Goldlinie*.

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 648.

Alae sature violaceae, anticae fascia, basi et apice, lineisque longitudinalibus (5 - 7) aureis. Antennae longissimae albidae.

In *Evonymo vulgari.*

Long. lin. 2^r.

180. *Rufimitrella*, das Rauchmützgen.

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 649.

Caput lana rufa vestitum. Corpus nigrum.

Alae fuscae, anticae supra fusco-viridi aeneae.

In Sylvestribus. Long. lin. 2½.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 15. Bräunlicht - Mef-
singfarbige Schabe. Unbek. R.

181. *Hemerobiella*, die Hemerobienmotte.

Scop. Ent. carn. p. 252. no. 650.

Alae anticae canae, fusco-punctulatae. Ti-
biae posticae plumosae.

Frisch Inf. I. p. 37. 3 Pl. t. XI. f. 1-6. von der Blatt-
motte, die mit aufgerichteter gerader Hülse fort-
kriecht. *)

182. *Obscurella*, der Dusterling.

Scop. Ent. carn. p. 252. no. 652.

Fusca; alis anticis supra fusco-auratis, apice
subhaematiticis.

In Carniolia inferiore.

Long. lin. 3.

183. *Fenestrella*, die Fenstermotte.

Scop. Ent. carn. p. 252. no. 653.

Alae anticae albae; maculis punctisque ni-
gris, postice nebula subaurata.

Circa fenestras occurrit primo vere.

Long. lin. 3.

184. *Scaella*, die Treppenmotte.

Scop. Ent. carn. p. 253. no. 654.

Alae anticae albae; tribus paribus punctorum
nigrorum, contiguorum, totidem obliquas ae-
que diffitas veluti fascias praeferentium.

K 2

Ruri.

*) Dies die perpendicular stehenden braunen Bälglein auf den
Apfel- und Birnblättern.

Ruri. Long. lin. 2.

185. *Punctella*, der *Punktling*.

Scop. Ent. carn. p. 253. no. 655.

Alae anticae niveae; punctis fuscescentibus, in apice confluentibus variegatae.

Ruri inter *Corylos*. Long. lin. $2\frac{1}{2}$.

186. *Comella*, das *Weißhaar*.

Scop. Ent. carn. p. 253. no. 656.

Capillitium album, alba coma per marginem alae internum decurrente auctum. Alae anticae ferrugineae fascia obscuriore, obsoleta, obliqua.

Circa domos et hortos.

Long. lin. $2\frac{1}{4}$.

187. *Pusiella*, der *Zwerg*.

Scop. Ent. carn. p. 253. no. 657.

Alae anticae cauda repanda terminatae, posticae lineares.

In *Pratis*. Long. lin. $1\frac{1}{2}$.

188. *Thrasonella*, der *Praler*.

Scop. Ent. carn. p. 253. no. 658.

Alae anticae fusco-auratae, lineis strigisque transversis argenteis, macula nigra ad angulum posticum, in qua puncta tria argentea.

In *herbidis paludosis*.

Long. lin. $2\frac{2}{3}$.

189. *Equitella*, das *Pferdeschwänzchen*.

Scop. Ent. carn. p. 254. no. 659.

Alae anticae caudula e margine exteriori nata, loboque terminatae; lituris in margine eodem quinis, in opposito vero binis argenteis.

In *herbidis paludosis*.

Long. lin. $2\frac{1}{3}$.

190. *Aruncella*, *Schwarzwurzelmotte.*

Scop. Ent. carn. p. 254. no. 660.

Alae anticae auratae, cum intermixto violaceo-rubro colore, fronte aureis pilis pubescente.

In Paniculis *Aëteae*, *Arunci.*

Long. lin. 1 $\frac{1}{4}$.

191. *Alchimiella*, *der Lanzettenfleck.*

Scop. Ent. carn. p. 254. no. 661.

Alae anticae aureae, striga transversa, antica, maculaque lanceolata apicis, laccae colore.

Circa Idriam. Long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

192. *Aureatella*, *der Goldröthling.*

Scop. Ent. carn. p. 254. no. 662.

Alae anticae rubro-auratae, fascia maculisque aureis.

In *Sylvestribus locis. Long. lin. 2 $\frac{1}{3}$.*

193. *Aeneella*, *der Kupferkönig.*

Scop. Ent. carn. p. 255. no. 663.

Fusca tota, alis anticis aeneo-fuscis.

In *Sylvis. Long. lin. 3.*

194. *Leucocerella*, *der weiße Doppelpunkt.*

Scop. Ent. carn. p. 255. no. 664.

Alae anticae aurato-rubrae, punctis binis obsoletis albis.

In *Sylvis. Long. lin. 2.*

195. *Luridella*, *der Schmutzling.*

Scop. Ent. carn. p. 255. no. 665.

Alae argenteae, anticae atomis punctisque fuscis inquinatae. Caput cum thorace album.

Circa Labacum. Long. lin. 3 $\frac{1}{2}$.

196. *Zoolegella*, *die Thiermotte.*

Scop. Ent. carn. p. 255. no. 666.

Pallide cervina; alis anticis puncto postico nigro.

In *Avium exuviis*, et *Insectis adservatis*, praesertim *Canceris*.

Huic proxima, et forte eadem, *Phal. Tin. Pelionella* Linn. no. 372, sed nostra non est cana.

Long. lin. 2½.

197. *Rufella*, der Fuchs.

Scop. Ent. carn. p. 255. no. 667.

Alae griseo-cinereae, corpore pedibusque rufis.

Circa *Labacum*. *Long. lin. 2½.*

198. *Murinella*, das Mäuslein.

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 668.

Alae pallide murinae.

In *Carniolia inferiore*. *Long. lin. 3.*

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 55. Mausfarbichte Schabe. Unbek. R.

199. *Arbustella*, die Strauchmotte.

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 670.

Alae anticae subargenteae, puncto nigro.

Inter *arbuta*. *Long. lin. 1½.*

200. *Domesticella*, die Hausmotte.

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 671.

Albida nitens, alis omnibus apice utrinque nigro nebulosis.

In *Cubilibus*. *Long. lin. 3.*

201. *De Bornella*, die Goldbinde.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 118. no. 137.

Antennis longissimis; alarum anticarum lineis aureis

aureis nigrisque, et fascia aurea violaceo margine moeniata.

Circa Schemnitz. Long. alae ant. lin. 5-6.

202. *Gronoviella*, das *Mohrenkind*.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 119. no. 138.

Alis nigris, punctis aureo-argenteis 8-9; marginalibus tribus maioribus.

Circa Schemnitium.

Alae anticae Long. lin. 4.

203. *Vandelliella*, die *Violetlinie*.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 119. no. 139.

Alae anticae aureae; linea media violacea, fascia versus basin argentea, violaceo-marginata.

Circa Schemnitium. Statura prioris.

204. *Cornella*, die *Korneelkirschenmotte*.

Fabric. S. E. p. 657. no. 8.

Alis niveis, fascia punctisque numerosis fuscis.

Habitat in Saxoniae corno.

— Spec. Inf. II. p. 291. no. 11. Tin. *Cornella*.

205. *Nigrella*, der *Rothafter*.

Fabric. S. E. p. 658. no. 19.

Nigra, alis fuscis, abdomine rufo.

In Daniae Nemoribus.

— Spec. Inf. II. p. 294. no. 24. Tin. *Nigrella*.

206. *Cryptella*, die *ostindianische Wellenstreife*.

Fabric. S. E. p. 658. no. 20.

Alis griseis, linea dimidiata albissima strigaeque postica undata, argentea.

In India orientali.

— Spec. Inf. II. p. 294. no. 25. Tin. *Cryptella*.

207. *Limbella*, der *Saumflügel*.

Fabric. S. E. p. 660. no. 27.

Alis ciliatis, exalbidis, limbo maculisque fuscis.

In *Germaniae Nemoribus.*

— *Spec. Inf. II. p. 296. no. 35. Tin. Limbella.*

208. *Undella, die Wellenmotte.*

Fabric. S. E. p. 661. no. 35.

Alis fusco-cinereis; lineola media fasciisque posticae undatis, albis.

— *Spec. Inf. II. p. 297. no. 47. Tin. Undella.*
In *Germania.*

209. *Compositella, der Rückenfleck.*

Fabric. S. E. p. 663. no. 46.

Alis fuscis; macula communi dorsali argentea, e strigis quatuor compositis.

In *Angliae Nemoribus.*

— *Spec. Inf. II. p. 300. no. 62. Tin. Compositella.*

210. *Drurella, die Drurella.*

Fabric. S. E. p. 666. no. 64.

Alis fusco-argenteis, fascia postica aurea.

Hafniae.

— *Spec. Inf. II. p. 305. no. 89. Tin. Drurella.*

211. *Aurella, der Goldflügel.*

Fabric. S. E. p. 666. no. 65.

Alis auratis, postice atris, fascia argentea. *Lipifae* in *Pomonae arboribus.*

— *Spec. Inf. II. p. 305. no. 92. Tin. Aurella.*

212. *Spissicella, das Dickhorn.*

Fabric. Mantiss. p. 295. no. 3-4.

Alis oblongis griseis, antennarum articulis duobus inferioribus *incrassatis.*

Chilo-

Chilonii.

Fabric. Spec. Inf. p. 289. no. 4. Tin. Spissicella.

213. *Arcella*, der *Braunbogen*.

Fabric. Mantiss. p. 295. no. 29-30.

Alis niveis; arcu communi maculisque duabus marginalibus fuscis.

In *Germania*.

— *Spec. Inf. II. p. 296. no. 38. Tin. Arcella.*

214. *Cylindrella*, die *Walzenförmige Motte*.

Fabric. Mantiss. p. 295. no. 34-35.

Alis anticis linearibus fuscis, maculis tribus flavis.

Hamburgi.

— *Spec. Inf. II. p. 297. no. 45. Tin. Cylindrella.*

215. *Bipunctella*, der *Zweypunkt*.

Fabric. Mant. p. 296. no. 38-39.

Alis fusco-cinereis, puncto marginali albo.

Hamburgi.

— *Spec. Inf. II. p. 298. no. 51. Tin. 2-punctella.*

216. *Sulphurella*, die *Schwefelmotte*.

Fabric. Mant. p. 296. no. 45-46.

Fusca, capite thorace alarumque basi maculaque costali sulphureis.

— *Spec. Inf. II. p. 300. no. 61. Tin. Sulphurella.*

In *Germaniae Nemoribus*.

217. *Seppella*, der *doppelte Silberstrich*.

Fabric. Mantiss. p. 296. no. 52-53.

Alis auratis, strigis duabus argenteis.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 301. no. 70. Tin. Seppella.*

218. *Cramerella*, der schwarze Endpunkt.

Fabric. Mantiss. p. 296. no. 64-65.

Alis pallide argenteis postice fuscis maculis marginalibus argenteis punctoque terminali atro.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 305. no. 90. Tin. Cramerella.*

219. *Linetella*, der lineirte Flügel.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 291. no. 12.

Alis albidis fusco-lineatis, apice strigis duabus fuscis.

In *Agro Pedemontano*.

220. *Strigella*, die silberne Randstreife.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 293. no. 22.

Alis anticis cinereo-flavescentibus, striga marginali argentea.

In *Germania*.

221. *Marginella*, der weiße Wulstrand.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 293. no. 23.

Alis anticis fuscis, margine crassiori albo, palpis porrectis incrassatis.

222. *Gramella*, die Winkelstreife.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 294. no. 26.

Alis cinereis, strigis duabus angulatis fuscis, argenteaque marginali.

In *Anglia*.

223. *Scalacella*, das schwarze Treppchen.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 294. no. 28.

Alis coerulescenti cinereis, punctis vitta media maculisque rhombeis contiguis atris.

Beschäftigungen der Berlin. Gesellsch. Naturf. Fr. III. p. 36. t. I. f. 6. (D. Kühn).

224. *Stigmatella*, der *weiße Rippenfleck*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 295. no. 34.

Alis sublinearibus ferrugineis, macula costali alba.

In *Anglia*.

225. *Clematella*, die *Waldrebenmotte*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 297. no. 41.

Alis anticis niveis, lineola baseos, fascia media punctoque apicis nigris.

In *Angliae Clematide*.

226. *4-punctella*, der *Vierpunkt*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 298. no. 52.

Alis fuscis, punctis duobus albidis.

In *Germania*.

227. *Fueslella*, der *Schwarzwinkel*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 301. no. 66.

Alis auratis argenteo subfasciatis, angulo ani macula atra, punctis tribus argenteis.

In *Germaniae Nemoribus*.

228. *Sulzerella*, die *abgebrochene Streife*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 301. no. 71.

Alis cinereis, strigis tribus abbreviatis lineolisque duabus apicis argenteis fusco-marginatis.

In *Africa aequinoctiali*.

229. *Schieffermüllerella*, die *Spaltstreife*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 302. no. 75.

Alis auratis, strigis tribus nigro-argenteis, tertia externe bifida.

In *Hamburgensibus arboretis*.

230. *Bergstraesserella*, der *Flachflügel*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 302. no. 76.

Alis

Alis *planis* auratis, limbo atro punctisque argenteis numerosis.

In *Germaniae Pomariis*.

231. *Stroemella*, die *Norwegische Waldmotte*.

Fabric. Spec. Inf. p. 303. no. 80.

Alis atris, punctis quatuor argenteis, maculisque quatuor marginalibus flavis.

In *Norwagiae Nemoribus*.

— Reise durch Norwegen p. 196.

231. *Gleichenella*, die *Englische Waldmotte*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 303. no. 81.

Alis planis atris, fascia media maculisque duabus apicis oppositis argenteis.

In *Angliae Nemoribus*.

232. *Schreberella*, der *Glanzfleck*.

Fabric. Spec. Inf. p. 304. no. 86.

Alis auratis, basi fasciis duabus maculisque duabus apicis argenteis nitidissimis.

In *Anglia*.

233. *Klemannella*, die *Englische Gartenmotte*.

Fabric. Spec. Inf. p. 304. no. 87.

Alis auratis argento subfasciatis, apice maculis duabus atris, interiori oblonga tripunctata.

In *Angliae hortis*.

234. *Blancardella*, der *Siebenfleck*.

Fabric. Spec. Inf. p. 305. no. 91.

Alis auratis, lineola apicis maculisque septem marginalibus argenteis.

In *Angliae Nemoribus*.

235. *Dentella*, die *Zahnbinde*.

Fabric. S. E. p. 667. no. 2. Alucita Dentella.

Alis fuscis, apice adscendentibus; vitta dorsali communi unidentata, alba.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 306. no. 3.

In Sueciae Caprifolio.

Larva glabra, viridis, linea dorsali purpurea.

Pupa flava intra folliculum fusiformem utrinque apertum.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 493. no. 1.

Phalène-teigne à bande jaune du Chevre-feuille.

— *Uebers. II Th. I B. p. 364. no. 1. die Mottenphaläne mit der gelben Binde auf den Geißblättern.*

Albin. Inf. t. 73. fig. e, f, g, h.

236. *Lucella*, der Schneekopf.

Fabric. S. E. p. 667. no. 4.

Alis flavis, immaculatis, capite thoraceque niveis.

In Suecia.

— *Spec. Inf. II. p. 307. no. 5.*

237. *Flavella*, die gelbe Rückenbinde.

Fabric. S. E. p. 667. no. 5.

Alis fuscis; vitta communi dorsali abbreviata maculaque flavis.

In Suecia.

— *Spec. Inf. II. p. 307. no. 6.*

238. *Bipunctella*, der schwarze Doppelpunkt.

Fabric. S. E. p. 668. no. 7.

Alis fuscis; vitta communi dentata, alba, thorace niveo; punctis duobus atris.

In Lichene prunastri Saxoniae.

Fabric.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 307. no. 8.

239. *Costella*, der *Rippenfleck*.

Fabric. S. E. p. 668. no. 10.

Nivea, alis rufo-auratis; macula costali bascos alba, fusco-punctata.

— *Spec. Inf. II. p. 308. no. 13.*

In *Anglia*.

240. *Fasciella*, die *Braunstreife*.

Fabric. S. E. p. 670. no. 18.

Alis auratis, fascia fusca, antennis apice albis.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 310. no. 23.*

241. *Sulphurella*, der *Schwefelfleck*.

Fabric. S. E. p. 670. no. 19.

Alis anticis auratis; maculis duabus sulphureis oppositis, posticis flavis.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 310. no. 25.*

242. *Oppositella*, der *Gegenfleck*.

Fabric. S. E. p. 670. no. 20.

Alis fuscis; maculis duabus oppositis flavis, posticis fuscis.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 310. no. 27.*

243. *Ephippella*, die *Sattelmotte*.

Fabric. Mantiss. p. 297. no. 1. 2. Alucita Ephippella.

Alis pallide auratis, vitta dorsali nivea, fascia aurea.

In *Europa*.

Fabric.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 306. no. 2.

244. *Niveella*, der *Grönländer*.

Fabric. Mantiss. p. 297. no. 8-9.

Alis niveis, maculis duabus marginalibus fasciaque media nigris, capite albo.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 308. no. II.*

245. *Marginella*, der *Schneerand*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 307. no. 8. Alucita Marginella.

Alis fusco-nitidis, marginibus niveis.

In *Iuniperetis Angliae*.

246. *Striatella*, der *Gelbstrich*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 310. no. 24.

Alis auratis, flavo-striatis, fascia media flavacupro marginata.

In *Angliae hortis*.

247. *Atomella*, die *Atomenmotte*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 518.

Alis ex albo fuscoque variis, strigis longitudinalibus nigro-punctatis; margine postico argenteo.

In *Pratis*.

248. *Wiedemanella*, der *blaue Silberpunkt*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 519.

Alis fulvis, fasciis maculisque albis, lineis punctisque coeruleo-argenteis.

In *Pratis*.

— *Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1601.*

249. *Obliquella*, die *Schregstreife*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 520.

Alis plumbeis, fasciis duabus obliquis albidis,
margine infima albo nigroque tessulato.

In *Pratis*.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1602.

250. *Ludvigella*, das braune Dreyeck. *)

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 522.

Alis griseis; basi priorum macula magna,
margine extimo triangulo minimo fusco.

In *Horto*.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1604.

251. *Hebenstreitella*, der Düstereck. **)

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 523.

Alis subfuscis, priorum maculis tribus obscu-
ris umbraticis.

In *Horto*.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1605.

252. *Filicella*, der Fadenflügel.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1600.

Alis superioribus apice in acumen erectis fu-
scis, linea dorsali communi medio divergente,
antennis pedibusque albis.

253. *Angulella*, der Silberwinkel.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1595.

Alis cinereis lanceolatis, superioribus angulis
duobus argenteis, lineolaque apicis nigra.

254. *Hauberella*, der Weißsaum.

Mülleri

*) Hierbey *Rösel* I. NV. 4. t. II. die doch mit *Linn.* *Cucullatella* no. 376. einerley ist.

**) Hierbey *Rösel* I. NV. 4. t. 2. Diese wird bald für *Linn.* *Tortrix Rosana* no. 293. bald für *Operana* no. 292. ausgegeben.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1596.

Alis anticis ciliisque albis, posticis utrinque,
anticisque subtus, nigro-cinereis.

255. *Albella*, die Schneemotte.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1597.

Alis totis albis ciliatis, oculis nigris.

Geoffr. Inf. II. p. 185. no. 8.

Tinea tota alba oculis nigris.

La Teigne blanche.

Long. 2½ lign.

256. *Goetzella*, die gelbe Längsstreife.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1598.

Alis fulvescentibus, superioribus striga longitudinali communi flava, linea marginis inferioris alba.

257. *Lupulella*, die Krummstreife.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1599.

Alis fulvescentibus; fascia marginis superioris incurvata, maculaque inferioris flavis.

258. *Auratella*, das silberne Ringelhorn.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1606.

Alis auratis, antennis annulo argenteo.

Der Dronth. Gesellsch. Schr. IV. p. 288. no. 54.

Tin. Aurata.

259. *Ciliatella*, der Dreysaum.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1607.

Alis linearibus; anticis atomis nigris, maculisque sparsis luteis, posticis ter ciliatis.

260. *Hirundinella*, der *Schwalbenschwanz*.

Geoffr. Inf. II. p. 182. no. 1.

Tinea corniculis duobus subulatis recurvis,
cinerea, alis macula fusca.

La Teigne à queue d'hirondelle.

Long. $3\frac{1}{2}$ lign. *Larg.* 2 lign.

261. *Radiella*, das *Strahlenband*.

Geoffr. Inf. II. p. 182. no. 2.

Tinea corniculis duobus subulatis recurvis,
alis flavescentibus nitidis, striarum albidarum or-
dine duplici transverso.

La Teigne à bandes rayonnées.

Long. 5 lign.

262. *Histrionella*, der *gelbe Harlekin*.

Geoffr. Inf. II. p. 184. no. 5.

Tinea alis flavis, fasciis maculisque nigris.

L'Arlequinette jaune.

Long. $4\frac{1}{2}$ lign.

263. *Nebulella*, die *Nebelmotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 185. no. 7.

Atro-plumbea, alis superioribus fusco-nebu-
lofis.

La Teigne plombée nébuleuse.

Long. 2 lign.

264. *Bordella*, die *Punktborste*.

Geoffr. Inf. II. p. 185. no. 9.

Cinerea, alarum margine inferiore punctis
nigris.

La Teigne à bordure depoints.

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

265. *Cruciella*, das *Ritterkreuz*.

Geoffr. *Inf.* II. p. 187. no. 12.

Fusca, cruce dorsi decussata alba.

La Teigne à croix de Chevalier.

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

266. *Triangulella*, das *dreyfache Dreyeck*.

Geoffr. *Inf.* II. p. 188. no. 15.

Nigra, alis pone albidis, macula triplici triangulari nigra.

La Teigne bedaude aux trois triangles.

Réaum. *Inf.* II. t. 40. f. 5.

267. *Quadrella*, die *Quadratmotte*.

Geoffr. *Inf.* II. p. 189. no. 16.

Alis nigris, superioribus macula quadrata alba ex quatuor lineolis albis transversis composita.

La Teigne à quarrure.

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

268. *Quadrillella*, der *Vierfleck*.

Geoffr. *Inf.* II. p. 189. no. 17.

Nigra, antice albidis, maculis quatuor nigris; pone nigris, maculis duabus albis.

La Teigne à quadrille.

Long. $2\frac{2}{3}$ lign.

269. *Duplicella*, die *Zweylinie*.

Geoffr. *Inf.* II. p. 189. no. 18.

Alis atris, punctorum alborum linea duplici transversa.

La Teigne noire à deux rangs de points blancs.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lign.

270. *Fasciella, das Vierband.*

Geoffr. Inf. II. p. 190. no. 20.

Alis dilute cinereis, fasciis tribus fuscis transversis undulatis.

La Teigne à quatre bandes brunes ondulées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lign.

271. *Viridella, das Grünband.*

Geoffr. Inf. II. p. 191. no. 23.

Alis corpori circumvolutis albido-roseis, fasciis tribus obscure virescentibus.

Le Manteau à bandes verdâtres.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lign.

272. *Rosella, der Rosenrand.*

Geoffr. Inf. II. p. 192. no. 25.

Alis corpori circumvolutis albescentibus, margine roseo.

Le Manteau couleur de Rose.

Long. 7 lign.

273. *Cinerella, die Aschmotte.*

Geoffr. Inf. II. p. 192. no. 26.

Fusco-cinerea, alarum macula rhomboïdaea albida oblonga.

Le lozange cendré.

Long. 3 lign.

274. *Fissella, die gespaltene Flügelader.*

Geoffr.

Geoffr. Inf. II. p. 192. no. 27.

Alis cinereis, superioribus nitentibus, nervis multifidis fuscis.

La Teigne à nervures.

Long. 5 lign.

275. *Mediella*, der *Zwischenfleck*.

Geoffr. Inf. II. p. 194. no. 30.

Alis flavescentibus, lineis duabus et macula intermedia fuscis in extremo superiorum.

L'Entre-ligne.

Long. 5 lign.

276. *Fuscorubella*, der *braune Mönch*.

Geoffr. Inf. II. p. 194. no. 31.

Fusco-rubra, alarum superiorum margine exteriori maculis duabus flavis.

La Teigne à deux taches jaunes en bordure.

Long. 3½ lign.

277. *Marmorella*, die *Märmormotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 195. no. 34.

Nigro-fusca, rivulis flavescentibus marmorata.

La Teigne à marbrure.

Long. 5 lign.

278. *Obliquella*, der *Sonderling*.

Geoffr. Inf. II. p. 196. no. 36.

Cinerea, alarum fascia triplici obliqua undulata fusca.

La Teigne grise à trois sautoirs bruns.

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

279. *Thoracella*, der gestreifte Brustschild.

Geoffr. Inf. II. p. 196. no. 37.

Capite thoraceque flavo lineis longitudinalibus fuscis, alis albo-flavescentibus, fasciis transversis fuscis.

La Teigne à corcelet rayé.

Long. 4 lign.

280. *Interruptella*, das Bruchband.

Geoffr. Inf. II. p. 197. no. 38.

Albo-flavescens, fasciis duabus obliquis ferrugineis, posteriore interrupta.

La Teigne à bande interrompue.

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

281. *Kochiella*, das Randdreieck.

Geoffr. Inf. II. p. 197. no. 39.

Alba, margine alarum exteriori maculis tribus fuscis, triangulum referentibus.

La Teigne à triangle marginal.

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

282. *Esperella*, das Fünfband.

Geoffr. Inf. II. p. 197. no. 40.

Alba, alis superioribus lineis quinque transversis fuscis.

La Teigne blanche à cinq bandes brunes.

Long. $1\frac{2}{3}$ lign.

283. *Laichartingella*, der eingeschnittene Rand.

Geoffr. Inf. II. p. 198. no. 41,

Fusca,

Fusca, linea duplici transversa flava, margine alarum undique flavo-intersecto.

La Teigne à bordure herminée.

Long. 2 lign.

284. *Schränkella*, der *Weißring*.

Geoffr. Inf. II. p. 198. no. 42.

Alis superioribus nigris, fascia longitudinali, maculisque duabus aureis, antennis medio-albis.

La Teigne à bande dorée, & anneau blanc aux antennes.

Long. $2\frac{3}{4}$ lign.

285. *Herbstella*, die *Safranmotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 200. no. 46.

Crocea, lineis transversis fusco-argenteis interruptis, alarum medio macula alba punctisque plumbeis.

La Teigne crayonnée.

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

286. *Borowskiella*, die *Schimmelmotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 201. no. 47.

Albida, lineis longitudinalibus reticulatis fuscis, involucro villoso-albescente.

La Teigne moisie.

Long. 4 lign.

287. *Bernoulliella*, die *Stielmotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 201. no. 48.

Alis cinereis, lineis albis, fasciaque longitudinali fusca, involucro fusco pediformi.

La Teigne à fourreau en crosse.

Long. 4 lign.

Réaum. Inf. Tom. III. t. 16.

288. *Kühnella*, die *Plattenmotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 202. no. 49.

Nigro-cinerea, involucro fusco recurvo, lamina duplici foliosa tecto.

La Teigne à fourreau à deux lames.

Long. 3 lign.

289. *Lapidella*, die *Steinmoosmotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 204. no. 53.

La Teigne des pierres à fourreau rond en capuchon.

(Noch nie zur Verwandlung gebracht.)

Réaum. Inf. III. t. 15. f. 1. 2. 3.

— No. 54. *La Teigne des pierres à fourreau triangulaire à pans.*

Réaum. Inf. III. t. 15. f. 7. 8.

290. *Anomalella*, der *Hautfuß*.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 495. no. 7.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes étroites élevées grises, d'une chenille mineuse du Rosier.

Phalène-teigne mineuse grise du Rosier.

Degeer Tom. I. t. 30. f. 20. t. 31. f. 13. 14. 16.

La Chenille une mineuse jaune à dix-huit pattes membraneuses & point de pattes écailleuses, qui mine les feuilles du Rosier en galeries.

— *Uebersf.* I. 3 Quart. p. 41. t. 30. f. 20. t. 31. f. 13. 14. 16.

— II Th. I B. p. 366. no. 7. die graue Rosenblattminirmotte.

Naturforscher 15tes St. p. 21. t. 2. f. 1. 12. die wahre, aber unendlich kleine Phaläne der Degeerischen Raupe mit 18 häutigen Wulstfüßen.

291. *Frangutella*, die Faulbaumotte.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 496. no. 8.

Phalène-teigne blanche, tachetée de brun de l'Aune noir.

— Tom. I. t. 32. f. 1. 4. 8. 9. 10. 11.

— *Uebersf.* I. 3 Quart. p. 49. t. 32. f. 1. 4. 8. 9. 10. 11.

— II Th. I B. p. 367. no. 8. die weiße braungefleckte Faulbeermottenphaläne.

292. *Chaerophyllella*, die Kälberkropfmotte.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 496. no. 9.

Phalène-teigne à ailes huppées, du Cerfeuil sauvage.

— Tom. I. t. 29. f. 9-18.

— *Uebersf.* I. 3 Quart. p. 46. t. 29. f. 9-18.

— II Th. I B. p. 367. no. 9. die wilde Kerbelmottenphaläne mit gebüschelten Flügeln.

293. *Entella*, die *Koromandelsche Entella*.

Cramer Pap. exot. III. p. 27. t. 208. Fig. D.

Alis flavis; anticis maculis purpurascentibus
rubro-marginatis, posticis flavo-venosis.

294. *Nobilitella*, der *Kurakaner*.

Cramer Pap. exot. III. p. 128. t. 264. Fig. G.

Alis anticis fusco-rubris, maculis albissimis
nigro-marginatis, posticis incarnatis fusco-mar-
ginatis.

295. *Molinella*, der *Scheckflügel*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 113. t. 348. Fig. G.

Alis anticis pulchre variegatis, posticis luteis.

296. *Florella*, die *Surinamische Florella*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 114. t. 348. Fig. L.

Fusca, flavo-maculata.

297. *Argentella*, die *Surinamische Silbermotte*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 135. t. 359. Fig. I.

Tota argentea, marginibus nigricantibus.

298. *Petronella*, die *Surinamische Petronella*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. K.

Testacea, atro-striata.

299. *Punctella*, der *Surinamische Goldpunkt*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. L.

Nigra, punctis aurantiacis atomisque flavis.

300. *Nigrella*, der *ostindianische Mohr*.

Linn. S. N. ed. 12. Tom. III. App. p. 225.

Alis atris, strigis albis, anteriore simplici, po-
steriore circumflexa.

Müllers Suppl. B. p. 314. G. no. 453. a. der *Weiß-
striem.*

VII. *Federmotten. Alucitae.*

(*Fächerfalter; Federvögel; Geistgen.* Les Papilions
à ailes en plumes. *Réaum.* Les Pterophores.
Geoffr. Phaléne - Tipule *Degeer*).

453. *Monodactyla*, die *Einfeder.*

Müller l. c. p. 756. no. 453. *Einfeder.*

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 848. Aluc. *Monoda-
ctyla.*

Réaum. Inf. I. t. 20. f. 12-16.

Fabric. S. E. p. 671. no. 1. *Pterophorus Mono-
dactylus.* Nom. *Linn.*

— *Spec.* Inf. II. p. 310. no. 1.

Mülleri Faun. Fridr. p. 59. no. 524. Aluc. *Monod.*
Nom. *Linn.*

— *Zool.* Dan. Pr. p. 138. no. 1608.

454. *Didactyla*, die *Zweyfeder.*

Müller l. c. p. 757. no. 454. *Zweyfeder.*

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 849. Aluc. *Dida-
ctyla.*

Gleditsch Forstwiss. II. p. 939. no. 4. Aluc. *Dida-
ctyla.*

*Die braune Feder - oder Fingermotte mit ästi-
gen zwey- und dreytheiligen Flügeln.*

Wien. Schmett. p. 145. no. 2. *Märzenwurzgeist-
chenraupe* (*Gei rivalis*); *Märzenwurzgeistchen.*
Al. *Didact.* L.

Schäffers Inf. III. p. 146. c. fig. der *Federfalter.*

— *Icon.* t. 159. f. 5. *Pterophorus secundus.*

Bekm. Ep. S. L. p. 168. no. 454.

Raj. Hist. Inf. p. 205. no. 101.

Phalaena minima, alis amplis, nervis rigidis, membrana connectente, facile disrupta a se invicem disiunctis.

Ex *Eruca parva incarnata*, Caprifolii folia depascente.

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 672.

Alae fuscae; anticae semibifidae, segmento inferiore falcato, omnibus rachi albida.

In *Pratis nostris*.

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 671. no. 2. *Pterophorus didactylus*.

Alis fissis, fuscis, strigis albis; anticis bifidis, posticis tripartitis.

In *Convolvulo*; *Geo rivali*.

— *Spec.* Inf. II. p. 310. no. 2.

Larva 16-poda, viridis, fasciculato-pilosa.

Pupa elongata, lineis duabus dorsalibus tuberculorum quadri-spinosorum.

Mülleri Faun. Fridr. p. 59. no. 525. *Aluc. didactyla*. Nom. *Linn.*

— *Zool.* Dan. Pr. p. 138. no. 1609.

(An *Schaeff.* Icon. t. 93. f. 7?)

Degeer Inf. Tom. II. p. 260. no. 1. t. 4. f. 1-9.

Phalène-Tipule à aile brunes rayées de blanc, dont les supérieures sont divisées en deux, & les inférieures en trois parties barbues.

Phalène-Tipule brune rayée de blanc.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 186. no. 1. t. 4. f. 1-9.

Die braune, weißgestreifte Erdschnakenphaläne.

455. *Tridactyla*, die *Dreyfeder*.

Müller l. c. p. 757. no. 455. t. 22. f. 18. *Dreyfeder*.

Füßl.

Füesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 850. Aluc. *Tridactyla*.

Scop. Ent. carn. p. 257. no. 675. Ph. *Tridactyla*.

Nivea tota, alis anticis ultra medium bifidis;
posticis trifidis.

In *Pratis*.

Long. lin. 6.

Poda Mus. graec. t. 2. f. 14.

Fabric. S. E. p. 671. *Pterophorus* 3. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 311. no. 3. In *Europae hortis*.

Beschäftigungen Naturf. Fr. zu Berl. III. t. 1. f. 8.
(*D. Kühn*).

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1610. An Al. *tridactyla*?

Alis patentibus fissis, griseis, macula fusca, lineaque apicis transversa alba; posticis tripartitis.

456. *Tesseradactyla*, die *Wolkenfeder*.

Müller l. c. p. 757. no. 456. *Wolkenfeder*.

Pontopp. N. G. v. Dännem. p. 222. t. 17.

Fabric. S. E. p. 671. *Pterophorus* 4. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 311. no. 4.

Mülleri Faun. Fr. p. 59. no. 527. Aluc. *Tesseradactyla*. Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1611.

457. *Tetradactyla*, die *Vierfeder*.

Müller l. c. p. 757. no. 457. t. 22. f. 19. *Vierfeder*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 20. die *Vierfeder*.

Mülleri Faun. Fr. p. 59. no. 528. Aluc. *Tetradactyla*. Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1612.

458. *Pterodactyla*, die *Flügelfeder*.

Müller

Müller l. c. p. 757. no. 458. *Flügelfeder*.

Pontopp. Nat. Gesch. von Dännem. p. 222. t. 17.

Wien. Schmett. p. 146. no. 6. Tab. I. a. f. 8. *Windlinggeistchenraupe* (*Convolvuli arvensis*); *Windlinggeistchen*. Tab. I. b. f. 8. A. *Pterodactyla* L.

Scop. Ent. carn. p. 257. no. 674.

Alae anticae bifidae, divisura lineari, puncto nigro medio notatae.

In pratis sterilioribus.

Long. lin. 4.

Fabric. S. E. p. 671. *Pterophorus* 5. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 311. no. 5.

Larva subpilosa coerulea, linea dorsali purpurea.

Geoffr. Inf. II. p. 92. no. 2.

Pterophorus fuscus, alis superioribus apice bipartitis, inferioribus tripartitis.

Le *Pterophore* brun.

Long. 10 lign.

Aët. Upsal. 1736. p. 26. no. 87. *Papilio* alis ramosis.

Mülleri Faun. Fr. p. 59. no. 526. Al. *Pterodactyla*. Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1613.

459. *Pentadactyla*, *Fünffeder*.

Müller l. c. p. 758. no. 459. *Fünffeder*.

Friesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 851. Aluc. *Pentadactyla*.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 12. t. 5. das kleine, dicke, blafsgrüne *Räuplein* mit braunen Punkten und hellen Streifen.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 31. *Fünffeder*.

Wien.

Wien. Schmett. p. 146. no. 9. Schlehengeistchen-
raupe (Pruni Spinolae); Schlehengeistchen. Aluc.
Pentadactyla L.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 28. weiße
Federmotte.

Behm. Epit. S. L. p. 168. no. 459. Aluc. Pentada-
ctyla.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 939. no. 3. Aluc. Penta-
dactyla.

Die weiße Federmotte mit fünfstheiligen Flie-
geln.

Fabric. S. E. p. 672. Pterophorus 6.

Alis niveis, anticis bifidis, posticis tripartitis.

— Spec. Inf. II. p. 311. no. 6.

Larva 16-poda, pilosa, viridis nigro-puncta-
ta lineaque dorsali alba.

Pupa pilosa, viridis, nigro-punctata.

Mülleri Faun. Fr. p. 59. no. 529. Aluc. Pentada-
ctyla. Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1614.

Geoffr. Inf. II. p. 91. no. 1. t. XI. f. 6.

Pterophorus albus, alis superioribus bipartitis,
inferioribus tripartitis.

Le Pterophore blanc.

Long. 1 pouce.

460. Hexadactyla, die Sechsfeder.

Müller l. c. p. 758. no. 460. Sechsfeder.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 852. Aluc. Hexada-
ctyla.

Frisch Inf. III. p. 20. no. 10. 2te Pl. t. 7. f. 1-5. von
dem kleinen Caprifoliumblüträuplein.

Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 372. no. 22. Al.
Hexadactyla.

Wien. Schmett. p. 146. no. 10. *Heckenkirschengest-
chenraupe* (Lonicerae Xylostei); *Heckenkirschen-
geistchen*. Al. *Hexadactyla* L.

Behm. Ep. S. L. p. 168. no. 460. Al. *Hexadactyla*.
Scop. Ent. carn. p. 258. no. 676.

Alae singulae sexpartitae fuscae albis transver-
sis lineolis fasciatae.

Circa *Labacum*.

Long. lin. $3\frac{1}{3}$.

Fabric. S. E. p. 672. *Pterophorus* 7.

Alis fissis, cinereis, singulis sexpartitis.

— Spec. Inf. II. p. 312. no. 7.

Geoffr. Inf. II. p. 92. no. 3.

Pterophorus cinereus, fusco-maculatus, alis
superioribus octopartitis, inferioribus quadripar-
titis.

Le *Pterophore en Evantail*.

Long. 6 lign.

Neue Arten von Federmotten.

1. *Diptera*; die *Einfeder*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 19.

Alis lanceolatis albidis, fusco-maculatis.

2. *Paradoxa*, *Meyersvögelein*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 21. vergröß.
f. 22.

Alis pilosis binis; elinguis, barba divisa ma-
gna.

Fortasse foemina —

3. *Ochrodactyla*, blaßröthlichgelbes *Geistchen*.

Wien. Schmett. p. 145. no. 1. Unbek. R.

4. *Trichodactyla*, Braunes weißgestrichtes Geistchen.
Wien. Schmett. p. 145. no. 3. Unbek. R.

5. *Calodactyla*, Dunkelbraun und Oraniengelb gemischtes Geistchen.

Wien. Schmett. p. 146. no. 4. Unbek. R.

An Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 267. no. 2. t. 3.
f. II. 12. *Phalène-Tipale brune?*

— Uebersf. II Th. I B. p. 190. no. 2. t. 3. f. II. 12.
die braune Erdschnakenphaläne.

6. *Rhododactyla*, Heckrosengeistchen.

Wien. Schmett. p. 146. no. 5. Heckrosengeistchen-
raupe (Rosae caninae).

7. *Leucodactyla*, Lungenkrautgeistchen.

Wien. Schmett. p. 146. no. 7. Lungenkrautgeistchen-
raupe (Pulmonariae officinalis).

8. *Megadactyla*, Weißlichtes bräunlichgeflecktes Geistchen.

Wien. Schmett. p. 146. no. 8. Unbek. R.

9. *Chrysodactyla*, Braunes Geistchen mit Goldglänzenden Querstrichen.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. Unbek. R.

10. *Mistodactyla*, Flachsblüthfarben, bleichroth und braungemischtes Geistchen.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. Unbek. R.

11. *Gonodactyla*, Bräunlichweißes Geistchen mit einem düstern Dreyeckfleckchen.

III. Th. IV. Band.

M

Wien.

Wien. Schmett. p. 320. Unbek. R.

12. *Galactodactyla*, *Milchrahmfarbenes Geistchen mit einem düstern Punkte.*

Wien. Schmett. p. 320. Unbek. R.

13. *Bipunctidactyla*, *die Zweypunktfeder.*

Scop. Ent. carn. p. 257. no. 673.

Alae anticae cinereae, punctis tribus, nigris, lineaque fusca longitudinali in limbo.

In Sylvestribus.

Long. lin. 4.

14. *Heterodactyla*, *der Fremdling.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 59. no. 530.

Alis patentibus fillis, nigris, maculis albis, anticis bifidis, posticis tripartitis.

In horto.

— *Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1615.*

Ende der Lepidopterorum.

Goeze, Johann August Ephraim,

Entomologische Beyträge Zu Des Ritter Linné Zwölften Ausgabe Des
Natursystems

Bd.: Dritten Theiles Vierter Band

Leipzig 1783

Zool. 212-3,3/4

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10307325-1

VD18 90544129